


สถานการณ์โรคไข้เลือดออก สัปดาห์ที่ ๓๔

นายแพทย์สุรเดช ชวะเดช

รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

สถานการณ์โรคไข้เลือดออกปี 2563




	จำนวนป่วย (ราย)	อัตราป่วย (ต่อแสน ปชก.)	จำนวนตาย (ราย)	อัตราตาย (ต่อแสน ปชก.)
ประเทศไทย	47738	72	32	0.05
ภาคตะวันออก เฉิงเหนือ	21509	97.76	9	0.04
เขต 10	3289	71.29	0	0
จ.ศรีสะเกษ	701	47.59	0	0

ข้อมูลเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2563

เปรียบเทียบอัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกในระดับประเทศสูงสุด

10 อันดับแรก




จังหวัดศรีสะเกษ พบอัตราป่วยอยู่ในที่อันดับที่ 49 ของประเทศ (สัปดาห์ 33 ลำดับที่ 49)

ที่มา : ข้อมูลเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา สำนักโรคระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ณ 30 ส.ค. 2563

เปรียบเทียบอัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


สูงสุด 10 อันดับแรก



จังหวัดศรีสะเกษ พบอัตราป่วยอยู่ในที่อันดับที่ 16 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สัปดาห์ที่ 33 อันดับ 16

ที่มา : ข้อมูลเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา สำนักโรคระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ณ 30 ส.ค. 2563


เปรียบเทียบอัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกกระดับประเทศ จังหวัดในเขตตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขที่ 10



จังหวัดศรีสะเกษ มีอัตราป่วยจัดอยู่ในลำดับที่ 3 รองจากมุกดาหารและอุบลราชธานี
(สัปดาห์ 33 อันดับ 3)

จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก จำแนกรายเดือน จ.ศรีสะเกษ

จำนวนผู้ป่วย(ราย) เปรียบเทียบข้อมูลปี 2563 กับค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง




จังหวัดศรีสะเกษ พบผู้ป่วยมากกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลังในทุกเดือน

ตั้งแต่ ม.ค.-มี.ค. ส่วนเดือน เม.ย. – ก.ค. พบผู้ป่วยต่ำกว่าค่ามัธยฐาน


อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน ด้วยโรค ไข้เลือดออกรวม(26,27,66) จำแนกตามกลุ่มอายุ
จังหวัด ศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2563

อัตราป่วย/แสน




จังหวัดศรีสะเกษ พบกลุ่มอายุ ป่วยโรคไข้เลือดออก 10-14 ปีมากที่สุด รองลงมา
คือ 15-24 ปี , 5-9 ปี , 0-4 ปี และ 25-34 ปี ตามลำดับ

จำนวนผู้ป่วยด้วยโรค ไข้เลือดออกรวม(26,27,66) จำแนกตามอาชีพ จังหวัด
ศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2563



จังหวัดศรีสะเกษ พบอาชีพเสี่ยงโรคไข้เลือดออก นักเรียนมากที่สุด รองลงมาคือ
เกษตรกร อื่นๆ และในปกครอง ตามลำดับ

อัตราป่วยโรคไข้เลือดออก จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2563 จำแนกรายอำเภอ




อำเภอที่มีอัตราป่วยสูง 5 อันดับแรก ได้แก่ ราษีไศล โนนคูณ กันทรารมย์ ยางชุมน้อยและโพธิ์ศรีสุวรรณ

กราฟแท่งอัตราป่วยต่อแสนประชากรโรคไข้เลือดออก สัปดาห์ที่ 34

เทียบกับอัตราป่วยสัปดาห์ที่ 20 จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2563


สัปดาห์ที่ **34** อำเภอที่มี อัตราป่วยไข้เลือดออกเพิ่มสูงสุด คือ ราศีไศล ยางชุมน้อย โพธิ์ศรีสุวรรณ ขุขันธ์ และพยุห์



กราฟแท่งจำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก สัปดาห์ที่ 34 เทียบกับ

สัปดาห์ที่ 20 จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2563


อำเภอที่มีจำนวนผู้ป่วยในสัปดาห์ที่ 34 สูงสุดได้แก่
กันทรลักษ์ ราชิไศล ขุขันธ์ เมืองศรีสะเกษและขุนหาญ



กราฟแท่งอัตราป่วยต่อแสนประชากรโรคไข้เลือดออก สัปดาห์ 34

เทียบกับสัปดาห์ที่ 33 จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2563


สัปดาห์ที่ **34** อำเภอที่มี อัตราป่วยไข้เลือดออกเพิ่มสูงสุด ราชิไศล ชูชนันท์ เบญจลักษณ์ โนนคูณ และ
ปรารังค์กู




กราฟแท่งอัตราจำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก สัปดาห์ 34

เทียบกับสัปดาห์ที่ 33 จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2563


สัปดาห์ที่ **34** อำเภอที่มี จำนวนป่วยไข้เลือดออกเพิ่มสูงสุด คือ ขุขันธ์ ราชิไศล เมืองศรีสะเกษ อุทุมพรพิสัย และกันทรลักษ์



จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสะสมรายเดือน เทียบกับจำนวน ผู้ป่วยระดับมาตรฐานที่ทำให้อัตราป่วยไม่เกินค่ามาตรฐาน 50 ต่อแสนประชากรสะสม จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2563



จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก เทียบกับจำนวนผู้ป่วยระดับมาตรฐานที่ทำให้ อัตราป่วยไม่เกิน 50 ต่อแสนประชากร จำแนกรายอำเภอ ในจังหวัดศรีสะเกษ ปี 2563



จำนวน ร้อยละ ตำบลที่พบการเกิดโรคไข้เลือดออก จำแนกรายอำเภอ จังหวัดศรีสะเกษ

ปี 2563

อำเภอ	ตำบลทั้งหมด	ตำบลเกิดโรค	ร้อยละเกิดโรค	ตำบลเกิดระบาดเกิน 28 วัน	ระบุ
เมือง	18	15	83.33	1	ต.โพนข่า
ยางชุมน้อย	7	4	57.14	2	ต.โนนคูณ ต.ยชน.
กันทรารมย์	16	11	68.75	0	
กันทรลักษ์	20	18	90.00	0	
ขุนซันธ์	22	18	81.82	4	ต.กันทรารมย์ ต.หัวเสือ ต.ตาอุด ต.โคกเพชร
ไพรบึง	6	3	50.00	0	
ปรางค์กู่	10	9	90.00	0	
ขุนหาญ	12	11	91.67	0	
ราษีไศล	13	12	92.31	3	ต.คู้ ต.ดำน ต.หนองหมี่
อุทุมพรพิสัย	19	15	78.95	2	ต.สำโรง ต.หนองห้าง
บึงบูรพ์	2	0	0.00	0	

จำนวน ร้อยละ ตำบลที่พบการเกิดโรคไข้เลือดออก จำแนกรายอำเภอ จังหวัดศรีสะเกษ

ปี 2563

อำเภอ	ตำบลทั้งหมด	ตำบลเกิดโรค	ร้อยละเกิดโรค	ตำบลเกิดระบาดเกิน 28 วัน	ระบุ
ห้วยทับทัน	6	5	83.33	0	
โนนคูณ	5	4	80.00	0	
ศรีรัตนะ	7	6	85.71	0	
น้ำเกลี้ยง	6	6	100.00	0	
วังหิน	8	5	62.50	0	
ภูสิงห์	7	6	85.71	1	ต.ละลม
เมืองจันทร์	3	0	0.00	0	
เบญจลักษ์	5	4	80.00	0	
พยุห์	5	3	60.00	0	
โพธิ์ศรีสุวรรณ	5	3	60.00	0	
ศิลาลาด	4	3	75.00	0	
รวม	206	161	78.16	13	

ข้อมูลการเกิดโรคไข้เลือดออกรายพื้นที่ จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2563

รหัสอำเภอ	อำเภอ	หมู่บ้าน ทั้งหมด	หมู่บ้าน เกิดโรค	ร้อยละ หมู่บ้าน เกิดโรค	หมู่บ้าน โรคสงบ (28วันไม่พบ ผู้ป่วย)	ร้อยละความ สำเร็จ การควบคุมโรค	หมู่บ้าน โรคยังไม่สงบ (28วันพบผู้ป่วย)	ร้อยละหมู่บ้าน โรคยังไม่สงบ (28วันพบผู้ป่วย)
3301	เมือง	209	33	15.79	21	63.64	12	36.36
3302	ยางชุมน้อย	80	15	18.75	11	73.33	4	26.67
3303	กันทรารมย์	175	41	23.43	40	97.56	1	2.44
3304	กันทรลักษ์	279	50	17.92	34	68.00	16	32.00
3305	ขุขันธ์	276	45	16.30	30	66.67	15	33.33
3306	ไพรบึง	80	9	11.25	7	77.78	2	22.22
3307	ปรางค์กู่	141	23	16.31	16	69.57	7	30.43
3308	ขุนหาญ	146	29	19.86	27	93.10	2	6.90
3309	ราษีไศล	190	47	24.74	32	68.09	15	31.91
3310	อุทุมพรพิสัย	233	33	14.16	20	60.61	13	39.39
3311	บึงบูรพ์	25	0	0.00	0	0.00	0	0.00

ข้อมูลการเกิดโรคไข้เลือดออกรายพื้นที่ จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2563

รหัสอำเภอ	อำเภอ	หมู่บ้าน ทั้งหมด	หมู่บ้าน เกิดโรค	ร้อยละ หมู่บ้าน เกิดโรค	หมู่บ้าน โรคสงบ (28วันไม่พบ ผู้ป่วย)	ร้อยละความ สำเร็จ การควบคุมโรค	หมู่บ้าน โรคยังไม่สงบ (28วันพบ ผู้ป่วย)	ร้อยละหมู่บ้าน โรคยังไม่สงบ (28วันพบผู้ป่วย)
3312	ห้วยทับทัน	81	13	16.05	13	100.00	0	0.00
3313	โนนคูณ	80	21	26.25	17	80.95	4	19.05
3314	ศรีรัตนะ	90	15	16.67	15	100.00	0	0.00
3315	น้ำเกลี้ยง	75	13	17.33	13	100.00	0	0.00
3316	วังหิน	126	6	4.76	3	50.00	3	50.00
3317	ภูสิงห์	86	11	12.79	6	54.55	5	45.45
3318	เมืองจันทร์	52	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3319	เบญจลักษ์	67	9	13.43	7	77.78	2	22.22
3320	พยุห์	66	9	13.64	9	100.00	0	0.00
3321	โพธิ์ศรีสุวรรณ	80	7	8.75	6	85.71	1	14.29
3322	ศีลาลาด	44	7	15.91	6	85.71	1	14.29
	รวม	2681	436	16.26	333	76.38	103	23.62

รายชื่อหมู่บ้านที่ยังพบผู้ป่วย 2 รายขึ้นไป ใน 28 วันย้อนหลัง
จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2563

อำเภอ	ตำบล	หมู่บ้าน	จำนวนผู้ป่วย
กันทรลักษ์	สวนกล้วย	หนองหิน	2
กันทรลักษ์	หนองหญ้าลาด	บกใต้	2
ขุขันธ์	โคกเพชร	สุขเกษม	2
ขุขันธ์	ห้วยเหนือ	ภูมิ	2
ภูสิงห์	ตะเคียนราม	ขยอง	2
เมือง	ท่ม	หนองม่วง	2
ยางชุมน้อย	โนนคูณ	โนนคูณ	2
ยางชุมน้อย	ยางชุมน้อย	ยางชุมน้อย	2
ราษีไศล	ดู่	ครึ่ง	2
ราษีไศล	สัมป่อย	บึงหมอกน้อย	2
อุทุมพรพิสัย	ลำโรง	ลำโรง	2
อุทุมพรพิสัย	หนองห้าง	ฟ้าผ่า	2

ผลการสำรวจลูกน้ำยุงลาย ปี 2563 สัปดาห์ที่ 34

อำเภอ	จำนวนรพ./รพ.สต. ทั้งหมด	จำนวนรพ./ รพ.สต. ที่รายงาน	ร้อยละ	จำนวนหมู่บ้าน ทั้งหมด	จำนวนหมู่บ้านที่ รายงาน	ร้อยละ	จำนวนหมู่บ้าน ที่ค่าHI<10	ร้อยละ
เมืองศรีสะเกษ	22	12	54.55	208	161	77.40	64	39.75
ยางชุมน้อย	7	5	71.43	80	80	100.00	43	53.75
กันทรารมย์	18	11	61.11	175	164	93.71	88	53.66
กันทรลักษ์	35	14	40.00	279	203	72.76	86	42.36
ขุขันธ์	28	20	71.43	276	257	93.12	121	47.08
ไพรบึง	8	4	50.00	80	80	100.00	39	48.75
ปรางค์กู่	14	7	50.00	141	129	91.49	70	54.26
ขุนหาญ	20	3	15.00	145	117	80.69	47	40.17
ราษีไศล	15	6	40.00	190	184	96.84	100	54.35
อุทุมพรพิสัย	22	16	72.73	233	232	99.57	150	64.66
บึงบูรพ์	3	1	33.33	25	25	100.00	17	68.00

ผลการสำรวจลูกน้ำยุงลาย ปี 2563 สัปดาห์ที่ 34

อำเภอ	จำนวนรพ./รพ.สต. ทั้งหมด	จำนวนรพ./ รพ.สต. ที่รายงาน	ร้อยละ	จำนวนหมู่บ้าน ทั้งหมด	จำนวนหมู่บ้านที่ รายงาน	ร้อยละ	จำนวนหมู่บ้าน ที่ค่าHI<10	ร้อยละ
ห้วยทับทัน	9	5	55.56	81	81	100.00	26	32.10
โนนคูณ	9	1	11.11	80	8	10.00	3	37.50
ศรีรัตนะ	9	5	55.56	90	83	92.22	28	33.73
น้ำเกลี้ยง	8	3	37.50	75	71	94.67	27	38.03
วังหิน	9	3	33.33	126	115	91.27	31	26.96
ภูสิงห์	10	4	40.00	86	61	70.93	32	52.46
เมืองจันทร์	5	4	80.00	52	51	98.08	10	19.61
เบญจลักษ์	7	2	28.57	67	63	94.03	11	17.46
พยุห์	7	3	42.86	66	64	96.97	32	50.00
โพธิ์ศรีสุวรรณ	9	9	100.00	80	80	100.00	59	73.75
ศิลาลาด	6	3	50.00	44	38	86.36	10	26.32
รวม	280	141	50.36	2,679	2,347	87.61	1094	46.61

ผลการสำรวจลูกน้ำยุงลาย ปี 2563 สัปดาห์ที่ 34

อำเภอ	จำนวน โรงเรียน ทั้งหมด	จำนวน โรงเรียนที่ รายงาน	ร้อยละ	จำนวนร.ที่ CI=0	ร้อยละ	จำนวน ศูนย์เด็ก ทั้งหมด	จำนวน ศูนย์เด็กที่ รายงาน	ร้อยละ	จำนวน ศูนย์เด็ก ที่ CI=0	ร้อยละ
เมืองศรีสะเกษ	76	41	53.95	28	68.29	38	26	68.42	24	92.31
ยางชุมน้อย	19	18	94.74	12	66.67	14	14	100.00	12	85.71
กันทรารมย์	83	52	62.65	43	82.69	52	31	59.62	28	90.32
กันทรลักษ์	112	56	50.00	35	62.50	76	38	50.00	36	94.74
ขุขันธ์	92	66	71.74	52	78.79	70	57	81.43	55	96.49
ไพรบึง	38	30	78.95	26	86.67	17	11	64.71	11	100.00
ปรางค์กู่	50	29	58.00	20	68.97	32	18	56.25	17	94.44
ขุนหาญ	69	35	50.72	30	85.71	48	23	47.92	18	78.26
ราษีไศล	57	38	66.67	32	84.21	26	19	73.08	16	84.21
อุทุมพรพิสัย	68	57	83.82	52	91.23	43	38	88.37	38	100.00
บึงบูรพ์	7	5	71.43	5	100.00	7	4	57.14	4	100.00

ผลการสำรวจลูกน้ำยุงลาย ปี 2563 สัปดาห์ที่ 34

อำเภอ	จำนวน โรงเรียน ทั้งหมด	จำนวน โรงเรียนที่ รายงาน	ร้อยละ	จำนวนร.ร.ที่ CI=0	ร้อยละ	จำนวน ศูนย์เด็ก ทั้งหมด	จำนวน ศูนย์เด็กที่ รายงาน	ร้อยละ	จำนวน ศูนย์เด็ก ที่ CI=0	ร้อยละ
ห้วยทับทัน	30	26	86.67	21	80.77	21	17	80.95	16	94.12
โนนคูณ	33	2	6.06	0	0.00	16	0	0.00	0	0.00
ศรีรัตนะ	30	15	50.00	13	86.67	26	13	50.00	12	92.31
น้ำเกลี้ยง	26	17	65.38	10	58.82	16	9	56.25	8	88.89
วังหิน	36	25	69.44	21	84.00	24	15	62.50	12	80.00
ภูสิงห์	28	16	57.14	13	81.25	24	16	66.67	15	93.75
เมืองจันทร์	14	12	85.71	9	75.00	10	7	70.00	7	100.00
เบญจลักษ์	28	17	60.71	11	64.71	13	8	61.54	8	100.00
พยุห์	26	21	80.77	19	90.48	16	9	56.25	9	100.00
โพธิ์ศรีสุวรรณ	20	16	80.00	13	81.25	15	12	80.00	11	91.67
ศิลาลาด	16	10	62.50	7	70.00	8	6	75.00	6	100.00
รวม	958	604	63.05	472	78.15	612	391	63.89	363	92.84

ผลการสำรวจลูกน้ำยุงลาย ปี 2563 สัปดาห์ที่ 34

อำเภอ	จำนวนวัด ทั้งหมด	จำนวนวัดที่รายงาน	ร้อยละ	วัดที่ CI=0	ร้อยละ
เมืองศรีสะเกษ	117	70	59.83	48	68.57
ยางชุมน้อย	31	25	80.65	14	56.00
กันทรารมย์	126	87	69.05	70	80.46
กันทรลักษ์	219	105	47.95	67	63.81
อุษัณธ์	92	69	75.00	54	78.26
ไพรบึง	49	39	79.59	29	74.36
ปรางค์กู่	66	38	57.58	24	63.16
ขุนหาญ	95	40	42.11	31	77.50
ราษีไศล	111	81	72.97	70	86.42
อุทุมพรพิสัย	148	137	92.57	121	88.32
บึงบูรพ์	14	12	85.71	10	83.33

ผลการสำรวจลูกน้ำยุงลาย ปี 2563 สัปดาห์ที่ 34

อำเภอ	จำนวนวัด ทั้งหมด	จำนวนวัดที่ รายงาน	ร้อยละ	วัดที่ CI=0	ร้อยละ
ห้วยทับทัน	47	37	78.72	28	75.68
โนนคูณ	47	6	12.77	2	33.33
ศรีรัตนะ	50	26	52.00	18	69.23
น้ำเกลี้ยง	43	23	53.49	19	82.61
วังหิน	57	40	70.18	19	47.50
ภูสิงห์	55	28	50.91	20	71.43
เมืองจันทร์	21	16	76.19	12	75.00
เบญจลักษ์	54	32	59.26	18	56.25
พยุห์	41	31	75.61	24	77.42
โพธิ์ศรีสุวรรณ	40	31	77.50	26	83.87
ศีลาลาด	29	17	58.62	11	64.71
รวม	1,552	990	63.79	735	74.24



สรุป

- อำเภอที่มีอัตราป่วยสูง ได้แก่ ราชสีห์ ไชยภูมิ กันทรารมย์ ยางชุมน้อยและโพธิ์ศรีสุวรรณ
- อำเภอโดยส่วนใหญ่มีการเกิดโรคร้อยละ 50 ขึ้นไป ของ ตำบล และไม่เกิดโรค 2 อำเภอ ได้แก่ เมืองจันทร์ และ บึงบูรพ์
- หมู่บ้านที่ยังคงมีผู้ป่วยใน **28** วัน จำนวน 103 หมู่บ้าน ลดลง 1 หมู่บ้าน (สัปดาห์ที่ 33=**114** หมู่บ้าน)

ข้อเสนอแนะ

1. การดำเนินการควบคุมโรคยังให้เน้นดำเนินการ 33171428 อย่างจริงจัง
2. ควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายให้ครอบคลุม ต่อเนื่อง
3. การใช้สเปรย์กระพोंงในการควบคุมโรค และในหลังคาเรือน ที่มีอาการสงสัย และยาทากันยุง
4. พบลูกน้ำในภาชนะทั้งนอกบ้านและในบ้าน

ขอความร่วมมือ

เร่งรัดการควบคุมลูกน้ำยุงลาย ในพื้นที่เกิดโรค

103 หมู่บ้าน

โรคอาหารเป็นพิษจากการ
รับประทานหอยป่า

สถานการณ์โรคอาหารเป็นพิษจากการรับประทานเห็ดป่า

ประเทศไทย ณ 17 สค.63

ผู้ป่วย **1686** ราย ใน **45** จังหวัด

อัตราป่วย **2.54** ต่อแสนปชก. เสียชีวิต **9** ราย

อัตราส่วนเพศ ชาย:หญิง = **1:1.73**

กลุ่มอายุ 45-65 ปี = **68.39%**


จังหวัดศรีสะเกษมีอัตราป่วย **12.50/**แสน
ปชก. (**190** ราย เสียชีวิต 2 ราย)

อันดับที่ 2 ของประเทศ รองจาก


อุบลราชธานี (**51.71/**แสน ตาย 6 ราย)

อันดับ 2 ของภาค **E/N**

อันดับ 2 ของเขตสุขภาพที่ **10**




อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน ด้วยโรค **Mushroom poisoning** จำแนกตามพื้นที่ จังหวัด
ศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 26 สิงหาคม 2563




อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน ด้วยโรค **Mushroom poisoning** จำแนกตามกลุ่มอายุ จังหวัด ศรีสะเกษ ระหว่าง
วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 26 สิงหาคม 2563


อัตราป่วย/แสน



จำนวนผู้ป่วยด้วยโรค **Mushroom poisoning** จำแนกตามอาชีพ จังหวัด
ศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 26 สิงหาคม 2563



จำนวนผู้ป่วยด้วยโรค **Mushroom poisoning** จำแนกรายเดือน จังหวัด ศรี
สะเกษ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 26 สิงหาคม 2563



เห็ดระโงกหิน, เห็ดไข่ตายซาก



Amanita virosa



Amanita verna



เห็ดชนิดนี้ สารพิษไม่ถูก
ทำลายด้วยความร้อน

สารพิษ

(amatotoxin, phallotoxin)

ทำลายเซลล์ตับ ไต

ระบบทางเดินอาหาร

ระบบหายใจ และสมอง

เห็ดที่กินได้



ดอกพื้วมัน เรียบ
ก้านกลวง
กระเปาะโป่งพอง
ไม่แนบติดก้าน



ดอกพืวมัน เรียบ

ก้านกลวง

กระเปาะโป่งพอง ไม่แนบติดก้าน

กินได้

วิธีสังเกตเห็ดพิษ เห็ดกินได้

เห็ดพิษ

- หมวกดอก มีหลายสี
ผิวขรุขระ ขอบหมวก
ไม่เรียบ
- ก้านดอก มีขน ก้านตัน
- กระจเปาะหุ้มโคน แนบ
ติดก้าน

เห็ดกินได้

- ผิวมัน เรียบ
- เรียบ ก้านกลวง
- โป่งพอง ไม่แนบติด
ก้าน

อย่าเชื่อการทดสอบเกิดด้วยวิธีต่างๆ เพราะไม่เป็นความจริง



ไม่จริง



ใช้ซ่อนเงินคน

เวลานำเห็ดมาทำอาหาร

ถ้าซ่อนเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลแสดงว่าเห็ดมีพิษ



ไม่จริง



นำข้าวไปต้มกับแกงเห็ด

ถ้าข้าวไม่สุกหรือเปลี่ยนสีแสดงว่าเป็นเห็ดมีพิษ



ไม่จริง



ใช้ปูนกินหมากป้ายดอกเห็ด

ถ้าเป็นเห็ดพิษปูนจะเปลี่ยนเป็นสีม่วงปนน้ำตาล



ไม่จริง



ใส่หัวหอมลงในหม้อต้มเห็ด

ถ้าเป็นเห็ดพิษ น้ำต้มเห็ดเปลี่ยนเป็นสีดำ



ไม่จริง



เลือกเห็ดที่มีรอยกัดแทะ

ของแมลง



ไม่จริง



ดูสีเห็ด สีสวยงาม เป็นเห็ดพิษ

ส่วนเห็ดสีขาว กินได้

การป้องกันอันตรายจากเห็ดพิษ

1. รู้จัก และจดจำเห็ดพิษที่สำคัญ ที่มีพิษรุนแรงถึงตายได้
(โดยเฉพาะเห็ดระโงกพิษ)
สังเกต : ขอบหมวก กลิ่น ก้าน ปลอกหุ้มโคน
ระวัง หรือไม่กินเห็ดที่ยังเป็นไข หรือเห็ดอ่อนอยู่
2. อย่ากินเห็ดที่สงสัย หรือไม่รู้จัก กินเห็ดที่เพาะได้ทั่วไปจะปลอดภัยกว่า
3. อย่ากินเห็ดที่ปรุงไม่สุก หรือสุกๆดิบ ไม่กินเห็ดดิบดอง
4. อย่ากินเห็ดพร้อมดื่มสุรา

การลดความรุนแรงของพิษเบื้องต้น



ล้างด้วยน้ำสะอาดปริมาณมาก



ทำให้อาเจียน




ลดการดูดซึมสารพิษ



โรคไข้ปวดข้อยุ่งลาย

CHIKUNGUNYA

สถานการณ์โรคไข้ปวดข้อยุงลาย



ประเทศไทย ณ 24 สค.63

ผู้ป่วย **7396** ราย ใน **69** จังหวัด

อัตราป่วย **11.16** ต่อแสนปชก.

ไม่มีผป.เสียชีวิต

อัตราส่วนเพศ ชาย:หญิง = **1 : 1.31**

กลุ่มอายุ 25-54 ปี = **50.49%**

จังหวัดศรีสะเกษมีผป. **94** ราย


อัตราป่วย **6.38/**แสน ปชก. ไม่มีผู้เสียชีวิต

อันดับที่ **17** ของประเทศ

อันดับ **4** ของภาค


รองจาก เลย บึงกาฬ นครพนม

อันดับ **1** ของเขตสุขภาพที่ **10**




อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน ด้วยโรค **Chikungunya fever** จำแนกตาม
กลุ่มอายุ จังหวัด ศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 26 สิงหาคม
2563

อัตราป่วย/แสน




จำนวนผู้ป่วยด้วยโรค **Chikungunya fever** จำแนกตามอาชีพ จังหวัด
ศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 26 สิงหาคม 2563



จำนวนผู้ป่วยด้วยโรค **Chikungunya fever** จำแนกรายเดือน จังหวัด ศรี

สะเกษ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 26 สิงหาคม 2563



สถานการณ์โรคไข้ปวดข้อยุงลาย จ.ศรีสะเกษ ณ 24 สค.63

อำเภอที่มีอัตราป่วยสูง ได้แก่ ศรีรัตนะ ภูสิงห์ เมืองศรีสะเกษ ขุขันธ์
อำเภอที่ยังไม่มีผู้ป่วย จำนวน 8 อำเภอ ได้แก่ ปรางค์กู่ บึงบูรพ์
โนนคูณ น้ำเกลี้ยง เมืองจันทร์ เบญจลักษ์ พยุห์ ศีลาลาด

การมีผู้ป่วยที่รายงาน 1 ราย จะมีผู้มีอาการในชุมชนมากกว่า 10 ราย
มีุงลายเป็นพาหะนำโรค

ระยะฟักตัวของโรค : 2-12 วัน (โดยทั่วไป 4-8 วัน)

อาการของโรค : ไข้เฉียบพลัน ปวดศีรษะมาก คลื่นไส้ อาเจียน อ่อนเพลีย
ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะมีอาการปวดข้อ ข้อบวมแดงอักเสบและเจ็บ หลังจากนั้นจะเกิด
ผื่นบริเวณลำตัวและแขนขา มักไม่คัน หรืออาจมีผื่นขึ้นที่กระพุ้งแก้มและเพดาน
ปาก

การรักษา : ไม่มีการรักษาจำเพาะ ใช้การรักษาตามอาการ โดยเฉพาะอาการ
ปวดข้อ กินยาพาราเซตามอลเพื่อลดไข้ (ห้ามกินยาแอสไพรินลดไข้เป็นอันตราย)

มาตรการป้องกันโรค

- ค้นหาผู้มีอาการสงสัยในชุมชนโดยเร็ว ทายากันยุง
- พ่นเคมีกำจัดยุงลาย
- ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย **5ป1ข** และลูกน้ำให้ครอบคลุม
- สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ และให้สุขศึกษาแก่ชุมชน
- แนะนำประชาชนในครัวเรือนที่มีผู้ป่วยโรคชิคุนกุนยาในบ้าน ต้องให้ผู้ป่วย**นอนในมุ้ง** เพื่อป้องกันไม่ให้ยุงลายไปกัด และแพร่เชื้อได้ ซึ่งเชื้อโรคนี้จะแพร่ขณะที่มีไข้สูง (ในระยะ 2-3 วันหลังเริ่มป่วย)