



การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อที่สำคัญ
ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566



- ❖ สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
- ❖ สถานการณ์โรคไข้เลือดออก
- ❖ สถานการณ์โรคเลปโตสไปโรสิส
- ❖ สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสมาลาเรีย
- ❖ สถานการณ์โรคไข้หวัดนก



สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019


สถานการณ์ COVID-19 ประเทศไทย

ระลอกเดือนมกราคม 2565 ข้อมูลตั้งแต่เดือน มกราคม 2565




สถานการณ์ผู้ป่วย COVID-19 ตามพื้นที่ รายสัปดาห์

อัปเดตล่าสุด : 26 ก.พ. 66 7:42:11 ก่อนเที่ยง



จำนวนผู้ป่วยรายสัปดาห์



แหล่งที่มาของข้อมูล +tableau



SAT - MOPH

<https://ddc.moph.go.th/covid19-dashboard>



สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดศรีสะเกษ

ระลอกเดือนมกราคม 2565 ข้อมูลตั้งแต่เดือน มกราคม 2565

สัปดาห์ที่ 8 : 19 – 25 กุมภาพันธ์ 2566

จำนวนผู้ป่วยรักษาตัวในโรงพยาบาลรายใหม่
สัปดาห์นี้ (By RT-PCR&ATK)

+2 ราย

ผู้ป่วยสะสม ตั้งแต่ระลอก มกราคม 2565

30,852 ราย

ผู้ป่วยสะสม ตั้งแต่ระลอก เมษายน 2564

48,979 ราย

จำนวนผู้เสียชีวิตรายใหม่สัปดาห์นี้

+0

เสียชีวิตระลอก ม.ค. 65

273

อัตราป่วยตาย 0.86%

ผู้ป่วยสะสม ตั้งแต่ระลอก เมษายน 2564

366

อัตราป่วยตาย 0.73%

การได้รับวัคซีน

สรุปการฉีดวัคซีนในจังหวัดศรีสะเกษในประชาชน อายุ 6 เดือนขึ้นไป ครบคลุมประชากรตามทะเบียนราษฎร์


ฉีดช่วงแรก	เข็ม 1	เข็ม 2	เข็ม 3	เข็ม 4	เข็ม 5	เข็ม 6
ฉีดช่วงแรก	ฉีดช่วงแรก	ฉีดช่วงแรก	ฉีดช่วงแรก	ฉีดช่วงแรก	ฉีดช่วงแรก	ฉีดช่วงแรก
26,682	3,456	2,923	8,010	10,139	2,060	93
ฉีดสะสมในจังหวัด	ฉีดเข็ม1	ฉีดเข็ม2	ฉีดเข็ม3	ฉีดเข็ม4	ฉีดเข็ม5	ฉีดเข็ม6
2,226,908	850,103	794,589	372,064	44,618	3,723	105
	ครอบคลุมร้อยละ	ครอบคลุมร้อยละ	ครอบคลุมร้อยละ	ครอบคลุมร้อยละ	ครอบคลุมร้อยละ	ครอบคลุมร้อยละ
	83.02	77.6	36.34	4.36	0.36	0.15

วาระแห่งชาติ
วัคซีนโควิด 19 จังหวัดศรีสะเกษ
ปี 2566





ผลการฉีดวัคซีนโควิด-19 แยกรายอำเภอ



ผลการดำเนินงาน
ฉีดวัคซีนโควิด-19
จังหวัดศรีสะเกษ

กลุ่ม 4 เดือน- 1 ปี ร้อยละ 4.22

ลำดับที่

18

ของประเทศ (ม.ค.=27)

เข็มที่ 3 กลุ่ม 608 ร้อยละ 31.64

ลำดับที่

38

ของประเทศ (ม.ค.=39)

เข็มที่ 3 กลุ่ม 607 ร้อยละ 39.18

ลำดับที่

40

ของประเทศ

เข็มที่ 3 ทุกกลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ 31.64


ลำดับที่

44

ของประเทศ
(ม.ค.=44)



การดำเนินการฉีดวัคซีนโควิด-19 จังหวัดศรีสะเกษ



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

ติดตามความก้าวหน้าการฉีดวัคซีน Covid-19 จังหวัดศรีสะเกษ
“รวมพลัง อสม. ส่งต่อภูมิคุ้มกัน ป้องกัน 608 ให้ปลอดภัย”

ข้อมูลถึงวันที่ 25-Feb-2566

(15 พฤศจิกายน 2565 - 15 มีนาคม 2566)

พัฒนาโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สสจ.ศรีสะเกษ

สรุปการฉีดวัคซีนในจังหวัดศรีสะเกษในประชาชน อายุ 6 เดือนขึ้นไป ครอบคลุมประชากรตามทะเบียนราษฎร

	เข็ม 1	เข็ม 2	เข็ม 3	เข็ม 4	เข็ม 5	เข็ม 6
ฉีดช่วงรณรงค์	ฉีดช่วงรณรงค์	ฉีดช่วงรณรงค์	ฉีดช่วงรณรงค์	ฉีดช่วงรณรงค์	ฉีดช่วงรณรงค์	ฉีดช่วงรณรงค์
27,013	3,474	2,964	8,131	10,266	2,084	93
ฉีดสะสมในจังหวัด	ฉีดเข็ม1	ฉีดเข็ม2	ฉีดเข็ม3	ฉีดเข็ม4	ฉีดเข็ม5	ฉีดเข็ม6
2,227,239	850,072	794,593	372,201	44,737	3,749	105
	ครอบคลุมร้อยละ	ครอบคลุมร้อยละ	ครอบคลุมร้อยละ	ครอบคลุมร้อยละ	ครอบคลุมร้อยละ	ครอบคลุมร้อยละ
	83.03	77.61	36.35	4.37	0.37	0.15

ข้อมูลการฉีด ณ วันที่ 25 ก.พ. 66



ผลการฉีดวัคซีนโควิด-19 แยกรายอำเภอ

ที่มา : ฐานข้อมูล MOPH Immunization Center ณ วันที่ 25 ก.พ. 66

สรุปผลการฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็มที่ 1-5

ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดศรีสะเกษ แยกรายอำเภอ

ลำดับ	อำเภอ	เป้าหมาย	เข็ม1	ร้อยละ	เข็ม 2	ร้อยละ	เข็ม3	ร้อยละ	เข็ม 4	ร้อยละ	เข็ม5	ร้อยละ
1	เมืองศรีสะเกษ	103,170	85,977	83.34	81,046	78.56	46,780	45.34	8,376	8.12	978	0.95
2	ขุขันธ์	102,919	88,786	86.27	84,510	82.11	37,902	36.83	4,589	4.46	443	0.43
3	กันทรลักษณ์	170,043	133,102	78.28	122,458	72.02	46,051	27.08	6,412	3.77	631	0.37
4	ปรางค์กู่	41,243	35,006	84.88	33,269	80.67	16,828	40.8	1,944	4.71	130	0.32
5	วังหิน	37,176	30,969	83.3	28,778	77.41	13,721	36.91	1,645	4.42	98	0.26
6	โนนคูณ	27,280	21,815	79.97	20,277	74.33	8,417	30.85	711	2.61	43	0.16
7	ขุนหาญ	78,069	64,770	82.97	60,715	77.77	27,243	34.9	2,682	3.44	246	0.32
8	ไพรบึง	30,173	25,265	83.73	23,414	77.6	10,785	35.74	1,258	4.17	96	0.32
9	ห้วยทับทัน	27,196	23,025	84.66	21,608	79.45	12,752	46.89	1,169	4.3	57	0.21
10	น้ำเกลี้ยง	31,123	25,342	81.43	23,181	74.48	10,798	34.69	1,019	3.27	80	0.26
11	ราษีไศล	50,523	43,547	86.19	40,961	81.07	19,251	38.1	1,973	3.91	158	0.31
12	ศรีรัตนะ	36,689	29,595	80.66	27,137	73.96	12,317	33.57	1,341	3.66	73	0.2
13	ยางชุมน้อย	25,622	21,805	85.1	20,481	79.94	10,281	40.13	1,122	4.38	80	0.31
14	กันทรารมย์	68,349	55,181	80.73	51,604	75.5	21,504	31.46	2,276	3.33	177	0.26
15	อุทุมพรพิสัย	66,878	56,704	84.79	52,610	78.67	25,693	38.42	2,672	4	194	0.29
16	ภูสิงห์	35,260	29,444	83.51	27,253	77.29	10,945	31.04	1,198	3.4	53	0.15
17	ศิลาลาด	12,292	10,565	85.95	9,911	80.63	4,993	40.62	720	5.86	37	0.3
18	เบญจลักษ์	23,310	19,631	84.22	18,343	78.69	8,769	37.62	620	2.66	39	0.17
19	บึงบูรพ์	7,509	6,356	84.65	6,045	80.5	3,022	40.25	405	5.39	20	0.27
20	พยุห์	21,543	19,098	88.65	18,044	83.76	8,909	41.35	732	3.4	36	0.17
21	เมืองจันทร์	11,173	10,099	90.39	9,732	87.1	6,326	56.62	534	4.78	19	0.17
22	โพธิ์ศรีสุวรรณ	16,317	13,990	85.74	13,216	81	8,914	54.63	1,339	8.21	61	0.37
รวม		1,023,857	850,072	83.03	794,593	77.61	372,201	36.35	44,737	4.37	3,749	0.37



การฉีดวัคซีนโควิด-19 ทุกกลุ่มเป้าหมาย เข็มที่ 3 ที่มา : ฐานข้อมูล MOPH Immunization Center ณ วันที่ 25 ก.พ. 66

ตามประชากรทะเบียนราษฎรที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดจังหวัดศรีสะเกษ เป้าหมายร้อยละ 70

ลำดับ	อำเภอ	เป้าหมาย 100 % (A)	เป้าหมาย 70 % (B)	ผลงานฉีด เข็ม 3 (C)	คงเหลือ (B-C)	ร้อยละผลการดำเนินงาน (C/A)*100	ผลงานช่วงรณรงค์ วัคซีน (เข็มที่ 3) 15 พย 65 - 15 มีค 66 (D)	ร้อยละความก้าวหน้า ผลดำเนินงานช่วง รณรงค์ฯ (D/A)*100
1	เมืองจันทร์	11,173	7,821	6,326	1,495	56.62	29	0.26
2	โพธิ์ศรีสุวรรณ	16,317	11,422	8,914	2,508	54.63	23	0.14
3	ห้วยทับทัน	27,196	19,037	12,752	6,285	46.89	330	1.21
4	เมืองศรีสะเกษ	103,170	72,219	46,780	25,439	45.34	826	0.80
5	พยุห์	21,543	15,080	8,909	6,171	41.35	52	0.24
6	บราห์ม	41,243	28,870	16,828	12,042	40.8	1041	2.52
7	ศีลาแลด	12,292	8,604	4,993	3,611	40.62	138	1.12
8	บึงบูรพ์	7,509	5,256	3,022	2,234	40.25	92	1.23
9	ยางชุมน้อย	25,622	17,935	10,281	7,654	40.13	239	0.93
10	อุทุมพรพิสัย	66,878	46,815	25,693	21,122	38.42	189	0.28
11	ราษีไศล	50,523	35,366	19,251	16,115	38.1	176	0.35
12	เบญจลักษ์	23,310	16,317	8,769	7,548	37.62	88	0.38
13	วังหิน	37,176	26,023	13,721	12,302	36.91	559	1.50
14	ขุขันธ์	102,919	72,043	37,902	34,141	36.83	1062	1.03
15	ไพรบึง	30,173	21,121	10,785	10,336	35.74	371	1.23
16	ขุนหาญ	78,069	54,648	27,243	27,405	34.9	288	0.37
17	น้ำเกลี้ยง	31,123	21,786	10,798	10,988	34.69	318	1.02
18	ศรีรัตนะ	36,689	25,682	12,317	13,365	33.57	342	0.93
19	กันทรารมย์	68,349	47,844	21,504	26,340	31.46	158	0.23
20	ภูสิงห์	35,260	24,682	10,945	13,737	31.04	210	0.60
21	โนนคูณ	27,280	19,096	8,417	10,679	30.85	460	1.69
22	กันทรลักษ์	170,043	119,030	46,051	72,979	27.08	1117	0.66
รวม		1,023,857	716,697	372,201	343,001	36.35	8108	0.79

การฉีดวัคซีนทุกกลุ่มเป้าหมาย เข็มที่ 3 (กระตุ้น) ช่วงรณรงค์ วันที่ 15 พ.ย. 65 - 15 มี.ค. 66


ลำดับ	อำเภอ	วันที่ ฉีดวัคซีนโควิด 19 (เข็มกระตุ้น)								
		15-30 พ.ย. 65	1-31 ธ.ค.65	1-28 มค 66	29 มค -5 กพ 66	5-12 กพ 66	13-19 กพ 66	20-25 กพ 66	รวมช่วงรณรงค์	ร้อยละเพิ่มขึ้น
		โดส	โดส	โดส	โดส	โดส	โดส	โดส	โดส	
1	ปรางค์กู่	16	540	326	111	37	8	3	1041	2.52
2	โนนคูณ	7	178	59	28	78	80	30	460	1.69
3	วังหิน	26	79	135	24	60	163	72	559	1.50
4	บึงนาราง	38	27	17	0	5	5	0	92	1.23
5	ไพรบึง	20	138	87	85	17	19	5	371	1.23
6	ห้วยทับทัน	35	124	60	2	47	62	0	330	1.21
7	ศีลาลาด	0	40	84	1	5	0	8	138	1.12
8	ขุขันธ์	164	573	204	24	32	55	10	1062	1.03
9	น้ำเกลี้ยง	12	51	129	79	11	33	3	318	1.02
10	ศรีรัตนะ	40	227	35	15	6	10	9	342	0.93
11	ยางชุมน้อย	30	63	32	60	6	42	5	238	0.93
12	เมืองศรีสะเกษ	43	381	211	55	24	26	86	826	0.80
13	กันทรลักษ์	107	385	476	55	22	56	15	1116	0.66
14	ภูสิงห์	3	34	20	32	121	0	0	210	0.60
15	เบญจลักษ์	43	32	11	1	0	1	0	88	0.38
16	ขุนหาญ	8	165	111	2	2	2	0	290	0.37
17	ราษีไศล	4	49	23	10	42	31	17	176	0.35
18	อุทุมพรพิสัย	0	84	80	9	6	10	0	189	0.28
19	เมืองจันทร์	4	22	2	1	0	0	0	29	0.26
20	พยุห์	6	27	12	2	1	4	0	52	0.24
21	กันทรารมย์	8	91	49	4	1	2	3	158	0.23
22	โพธิ์ศรีสุวรรณ	0	22	0	1	0	0	0	23	0.14
รวม		614	3,332	2163	601	523	609	266	8108	0.79



ความก้าวหน้าในการรณรงค์ฉีดวัคซีนโควิด-19

ที่มา : ฐานข้อมูล MOPH Immunization Center ณ วันที่ 25 ก.พ. 66

การรณรงค์ฉีดวัคซีนโควิด 19 ช่วงรณรงค์ 15 พย 65 - 15 มีค 66






สถานการณ์โรคไข้เลือดออก



สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2566

ระหว่างวันที่ 1-20 กุมภาพันธ์ 2566 เทียบกับค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง

จำนวนผู้ป่วย (ราย)







อัตราป่วยโรคไข้เลือดออก จังหวัดศรีสะเกษ


แยกรายอำเภอ

(ระหว่างวันที่ 1 ม.ค - 20 ก.พ. 2566)



- ไม่มีผู้ป่วยไข้เลือดออก
- อัตราป่วย <1 ต่อแสนประชากร
- อัตราป่วย 1-49 ต่อแสนประชากร
- อัตราป่วย ≥50 ต่อแสนประชากร
- อัตราป่วย/แสนประชากร
- จำนวนผู้ป่วยไข้เลือดออก
- ผู้ป่วยไข้เลือดออกเสียชีวิต








สถานการณ์โรคเลปโตสไปโรซิส



สถานการณ์โรคเลปโตสไปโรสิส จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2566

ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 20 กุมภาพันธ์ 2566 เทียบกับค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง

จำนวนผู้ป่วย (ราย)



- เดือน ก.พ. พบผู้ป่วย +3 ราย
- ปี 2566 ผู้ป่วยเลปโตสไปโรสิสสะสม 19 ราย
- อัตราป่วย 1.31 ต่อแสนประชากร
- ผู้ป่วยเลปโตสไปโรสิสน้อยกว่าค่ามัธยฐาน
- ยังไม่มีผู้เสียชีวิต




อัตราป่วยและพื้นที่เสี่ยงโรคโรคเลปโตสไปโรสิส

ผู้ป่วยโรคเลปโตสไปโรสิส ปี 2566

อำเภอ


- ไม่มีผู้ป่วย
- อัตราป่วยน้อยกว่า 5.40
- 5.40-8.87
- 8.88-12.47
- อัตราป่วยมากกว่า 12.47
- ผู้ป่วยเลปโตฯ เสียชีวิต



อำเภอ	จำนวน	อัตราป่วย/แสนประชากร	อัตราตาย/แสนประชากร	อัตราป่วยตาย (CFR%)
วังหิน	3	5.94	0.00	0.00
ศรีรัตนะ	3	5.65	0.00	0.00
ขุนหาญ	5	4.68	0.00	0.00
ปรางค์กู่	2	3.03	0.00	0.00
สุขันธ์	4	2.68	0.00	0.00
ราชไศล	1	1.26	0.00	0.00
กันทรารมย์	1	1.01	0.00	0.00
เมือง	0	0	0.00	0.00
ยางชุมน้อย	0	0	0.00	0.00
กันทรลักษ์	0	0	0.00	0.00
ไพรบึง	0	0	0.00	0.00
อุทุมพรพิสัย	0	0	0.00	0.00
บึงบูรพ์	0	0	0.00	0.00
ห้วยทับทัน	0	0	0.00	0.00
โนนคูณ	0	0	0.00	0.00
น้ำเกลี้ยง	0	0	0.00	0.00
ภูสิงห์	0	0	0.00	0.00
เมืองจันทร์	0	0	0.00	0.00
เบญจลักษ์	0	0	0.00	0.00
พยุห์	0	0	0.00	0.00
โพธิ์ศรีสุวรรณ	0	0	0.00	0.00
ศิลาลาด	0	0	0.00	0.00
รวม	19	1.31	0.00	0.00



ความเสี่ยงโรคเลปโตสไปโรสิส จำแนกตามกลุ่มอายุ





สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019



วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566
นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข



❑ กระทรวงสาธารณสุข ได้ติดตามสถานการณ์การระบาดของ **โรคติดเชื้อไวรัสมาร์บวร์ก (Marburg virus disease)** ในประเทศอิเควทอเรียลกินี (Equatorial Guinea) ในแอฟริกากลาง

❑ มีผู้เสียชีวิตแล้ว **9 ราย** ส่วนใหญ่มีอาการติดเชื้อรุนแรง เป็นไข้และอาเจียนเป็นเลือด

❑ มีผู้ป่วยสงสัย **16 ราย** ส่วนใหญ่มีอาการไข้ อ่อนเพลีย อาเจียนเป็นเลือดและท้องเสีย

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโรค

❑ ประเทศไทยกำหนดให้เป็น 1 ใน 13 โรคติดต่ออันตราย ตามพรบ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558

❑ มีอัตราการป่วยเสียชีวิตสูงถึงร้อยละ 88

❑ เป็นไวรัสในสกุลเดียวกับไวรัสอีโบล่า ผู้ป่วยจะมีไข้สูง ปวดศีรษะรุนแรง หลายรายมีเลือดออกและ อูจจารร่วง
อย่างรุนแรง

❑ สามารถติดต่อได้ทางเลือดและอูจจาระ

มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันที่สำคัญ

❑ ให้ด่านควบคุมโรคติดต่อ ได้วางระบบเฝ้าระวัง คัดกรอง ผู้เดินทางมาจาก **ประเทศอิเควทอเรียลกินี** และ
ประเทศใกล้เคียง รายงานผู้ป่วยสงสัยภายใน 3 ชั่วโมง




สถานการณ์โรคไข้หวัดนก

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566
นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์
อธิบดีกรมควบคุมโรค



- ❑ กระทรวงสาธารณสุข ได้ติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคไข้หวัดนก (H5N1) ในประเทศกัมพูชา จำนวน 1 ราย เป็นผู้ป่วยรายแรกในรอบ 9 ปี
- ❑ เป็นผู้ป่วยเพศหญิง อายุ 11 ปี อาศัยอยู่ใน จ.ไพรเวง ทางตะวันออกเฉียงใต้ของกัมพูชา
- ❑ เริ่มป่วย 16/2/2566 เข้ารับการรักษาตัวใน รพ.ท้องถิ่นด้วยอาการไข้สูง ไอ และเจ็บคอ ต่อมา มีภาวะการหายใจติดขัด จึงถูกส่งตัวมารักษาที่ รพ.เด็กแห่งชาติ ในพนมเปญ และเสียชีวิตในเวลาต่อมา ผลการเก็บตัวอย่างตรวจยืนยัน เป็น H5N1





นายแพทย์โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค



ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโรคไข้หวัดนก

- ❑ เกิดจากเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิดเอ (Influenza A) ที่พบในสัตว์ปีก
 - ❑ สายพันธุ์ที่สามารถติดต่อกันได้ คือ H5, H7
 - ❑ พบในสารคัดหลั่งของสัตว์ปีก จากจุก ปาก ตาและมูลของสัตว์ปีก
 - ❑ ระยะฟักตัวโดยเฉลี่ย 2-5 วัน (อาจยาวได้ถึง 17 วัน) หลังได้รับเชื้อ
 - ❑ อาการที่พบ ได้แก่ ไข้ ไอ เจ็บคอ คัดจมูก ปวดเมื่อยตัว ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย หายใจลำบาก และอาจพบอาการท้องเสีย อาเจียน ปวดท้องหรือชักเกร็งได้ สามารถติดต่อได้ทางเลือดและอุจจาระ
- มาตรการเฝ้าระวัง และการป้องกันที่สำคัญ**
- ❑ ให้ด่านควบคุมโรคติดต่อ ได้วางระบบเฝ้าระวัง คัดกรอง ผู้เดินทางมาจากประเทศกัมพูชาทุกราย โดยเฉพาะในอำเภอที่มีพื้นที่ติดต่อกับประเทศกัมพูชา

แนะนำสำหรับประชาชน

- ❑ หากมีไข้ ไอ ปวดเมื่อยตามตัว และมีประวัติสัมผัสสัตว์ปีกหรือผู้ป่วยปอดบวม ให้รีบไปพบแพทย์
- ❑ หลีกเลี่ยงการสัมผัสสัตว์ปีกที่มีอาการป่วยและตาย ให้รีบแจ้ง จนท.ปศุสัตว์มาตรวจสอบและดำเนินการทันที
- ❑ รับประทานเนื้อไก่และไข่ไก่ที่ปรุงสุกเท่านั้น
- ❑ ปฏิบัติตามหลักสุขอนามัย สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อย และทุกครั้งสัมผัสสัตว์ปีก