



การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อที่สำคัญ
ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ เดือน เมษายน 2568

กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
วันที่ 29 เมษายน 2568



สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ ปี 2568



สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2568

ระหว่างวันที่ 1 ม.ค. – 21 เม.ย. 2568 เทียบกับค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง

ปี 2566

ปี 2567


ปี 2568



กลุ่มข้อมูลการเฝ้าระวังและป้องกันโรค กระทรวงสาธารณสุข กรมควบคุมโรค โทร. 025903899

อัตราป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ (1 ม.ค.-21 เม.ย.68)

อำเภอ	ผู้ป่วยเพิ่ม เดือน เม.ย.	จำนวน	อัตราป่วย/แสนประชากร
ไพรบึง	26	484	1,025.75
เมืองศรีสะเกษ	36	907	660.74
บึงบูรพ์	2	62	593.30
กันทรารมย์	18	554	558.64
วังหิน	17	234	463.84
เบญจลักษ์	9	154	427.87
ราษีไศล	12	336	422.18
ขุนหาญ	31	320	300.31
กันทรลักษ์	57	479	238.95
ยางชุมน้อย	8	83	231.58
โนนคูณ	3	90	228.41
โพธิ์ศรีสุวรรณ	1	54	228.30
ขุขันธ์	43	321	215.11
พยุห์	6	74	211.54
อุทุมพรพิสัย	13	205	196.34
ปรางค์กู่	12	129	195.31
เมืองจันทร์	2	30	169.21
ศิลาลาด	2	29	147.10
ภูสิงห์	14	70	127.90
ห้วยทับทัน	5	53	125.75
ศรีรัตนะ	9	65	122.44
น้ำเกลี้ยง	1	38	85.63
รวม	+327	4,771	328.47



- ณ 21 เม.ย.68 ประเทศไทย พบผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ 293,900 ราย อัตราป่วย 452.77 ต่อแสน ปชก. เสียชีวิต 26 ราย อัตราตาย 0.04 ต่อแสน ปชก.
- จังหวัดศรีสะเกษ พบผู้ป่วย 4,771 ราย อัตราป่วย 328.47 ต่อประชากรแสนคน ผู้ป่วยเสียชีวิต 1 ราย อัตราตาย 0.07 ต่อแสนประชากร อันดับที่ 49 ของประเทศ อันดับที่ 15 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ อันดับที่ 4 ของเขต 10 มีแนวโน้มระบาดสูงในฤดูฝน
- เดือน เม.ย. 2568 พบผู้ป่วยรายใหม่ +327 ราย สูงกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปี
- อำเภอที่มีอัตราป่วยสูงสุด ได้แก่ อ.ไพรบึง 484 ราย อัตราป่วย 1,025 ต่อแสนประชากร
- ส่วนใหญ่เป็นเด็กอายุ 0-14 ปี
- แนะนำให้ปฏิบัติตามมาตรการสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง หลีกเลี่ยงไปในสถานที่แออัด



สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก ปี 2568




สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2568

ระหว่างวันที่ 1 ม.ค. – 21 เม.ย. 2568 เทียบกับค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง

ปี 2566


ปี 2567

ปี 2568



อัตราป่วยโรคมือ เท้า ปาก (1 ม.ค.-21 เม.ย.68)


อำเภอ	ผู้ป่วยเพิ่มเติม เม.ย.	จำนวน	อัตราป่วย/แสนประชากร
ยางชุมน้อย	12	35	97.65
โนนคูณ	4	21	53.30
พยุห์		18	51.46
วังหิน	1	20	39.65
กันทรารมย์	12	36	36.30
ปรางค์กู่	1	21	31.79
บึงบูรพ์		3	28.71
ขุขันธ์	6	32	21.44
ศรีรัตนะ		6	11.30
น้ำเกลี้ยง		5	11.27
ภูสิงห์	1	6	10.96
ไพรบึง		5	10.60
ศีลาลาด		2	10.15
เมืองศรีสะเกษ	2	12	8.74
กันทรลักษ์	1	15	7.48
ขุนหาญ		5	4.69
โพธิ์ศรีสุวรรณ		1	4.23
ราษีไศล		3	3.77
เบญจลักษ์		1	2.78
อุทุมพรพิสัย	1	2	1.92
เมืองจันทร์		0	0
ห้วยทับทัน		0	0
รวม	+50	249	17.14



- ณ 21 เม.ย.68 ประเทศไทย พบผู้ป่วยโรคมือ เท้า ปาก 12,121 ราย อัตราป่วย 18.67 ต่อแสนประชากร ไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิต
- จังหวัดศรีสะเกษ พบผู้ป่วย 2,323 ราย อัตราป่วย 10.70 ต่อแสนประชากร ไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิต อันดับที่ 38 ของประเทศ อันดับที่ 5 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และอันดับที่ 3 ของเขตสุขภาพที่ 10
- เดือน เม.ย. 2568 พบผู้ป่วยรายใหม่ +50 ราย
- อำเภอที่มีอัตราป่วยสูงสุด ได้แก่ ยางชุมน้อย 35 ราย อัตราป่วย 97.65 ต่อแสนประชากร
- ส่วนใหญ่เป็น เด็กอายุ 0-4 ปี และ 5-9 ปี
- ขอความร่วมมือ ในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ โรคมือ เท้า ปาก การสังเกตอาการ การเข้าถึงการรักษา และการป้องกันควบคุมโรคอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในช่วงเปิดเรียน เดือน พฤษภาคม 2568

จำนวนผู้ป่วย Hand foot and mouth disease


ปี พ.ศ. 2568 ปี พ.ศ. 2567 มัธยฐานผู้ป่วย 5 ปี





ลำดับ	อำเภอ	มัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง	อัตราป่วย	ร้อยละ
1	เมืองศรีสะเกษ	57.34	15.24	-73.42
2	ยางชุมน้อย	83.56	2.79	-96.67
3	กันทรารมย์	44.31	34.24	-22.73
4	กันทรลักษ์	47.17	1.49	-96.84
5	ขุขันธ์	66.27	9.37	-85.86
6	ไพรบึง	29.62	16.93	-42.86
7	ปรางค์กู่	65.05	1.51	-97.67
8	ขุนหาญ	38.41	14.05	-63.41
9	ราษีไศล	60.30	2.51	-95.83
10	อุทุมพรพิสัย	32.48	2.87	-91.18
11	บึงบูรพ์	0.00	0.00	0.00
12	ห้วยทับทัน	26.07	0.00	-100.00
13	โนนคูณ	22.82	2.54	-88.89
14	ศรีรัตนะ	15.07	0.00	-100.00
15	น้ำเกลี้ยง	18.02	9.01	-50.00
16	วังหิน	21.77	1.98	-90.91
17	ภูสิงห์	34.68	10.95	-68.42
18	เมืองจันทร์	0.00	5.62	100.00
19	เบญจลักษ์	41.70	8.34	-80.00
20	พยุห์	22.85	17.13	-25.00
21	โพธิ์ศรีสุวรรณ	16.90	4.23	-75.00
22	ศีลาลาด	15.20	0.00	-100.00
รวม		42.81	8.59	-79.94

กลุ่มอา



การสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นสิ่งสำคัญยิ่งต่อการดำเนินงานโครงการฯ การสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง



มาตรการป้องกันควบคุมโรคโรคไข้เลือดออก ปี 2568

มาตรการป้องกันโรคไข้เลือดออกของกระทรวงสาธารณสุข

1. มาตรการ "3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค"

- ❖ เก็บบ้าน ให้สะอาด ไม่ให้มีมุมอับทึบเป็นที่เกาะพักของยุง
- ❖ เก็บขยะ กำจัดขยะที่อาจขังน้ำได้ เช่น กระป๋อง ขวด ยางรถยนต์เก่า
- ❖ เก็บน้ำ ปิดฝาภาชนะเก็บน้ำให้มิดชิด เปลี่ยนน้ำในแจกันดอกไม้ทุก 7 วัน (โรคที่ป้องกันได้: ไข้เลือดออก ไข้ซิกา และไข้ปวดข้อยุงลาย)

2. การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

- ❖ สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในบ้านและรอบบ้านทุกสัปดาห์
- ❖ ใส่ทรายกำจัดลูกน้ำ (ทรายที่มีฟอส) ในภาชนะที่ไม่สามารถเปลี่ยนน้ำได้
- ❖ ปลอ่ยปลากินลูกน้ำในโอ่งหรือภาชนะเก็บน้ำขนาดใหญ่
- ❖ คว้าภาชนะที่ไม่ใช้เพื่อไม่ให้มีน้ำขัง

3. การเฝ้าระวังโรคในชุมชน

- ❖ จัดตั้งทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) ในระดับตำบล
- ❖ ตรวจวัดค่าดัชนีลูกน้ำยุงลาย (HI, CI, BI) อย่างสม่ำเสมอ
- ❖ รายงานผู้ป่วยสงสัยภายใน 24 ชั่วโมง และดำเนินการควบคุมโรคทันที

4. มาตรการ "5ป. 1ข." สำหรับป้องกันตนเอง

- ❖ ปิด ภาชนะเก็บน้ำให้มิดชิด
- ❖ เปลี่ยน น้ำในภาชนะทุก 7 วัน
- ❖ ปลอ่ย ปลากินลูกน้ำในภาชนะเก็บน้ำ
- ❖ ปรับปรุง สิ่งแวดล้อมไม่ให้แหล่งเพาะพันธุ์ยุง
- ❖ ปฏิบัติ เป็นประจำสม่ำเสมอ
- ❖ ชัด ภาชนะเก็บน้ำเพื่อกำจัดไข่ยุงที่ติดอยู่บริเวณขอบภาชนะ

5. การป้องกันการถูกยุงกัด


- ❖ นอนในมุ้ง โดยเฉพาะเด็กและผู้สูงอายุ
- ❖ ใช้ยาทากันยุงที่มีส่วนผสมของ DEET
- ❖ สวมเสื้อผ้าแขนยาว ขายาว โดยเฉพาะในเวลาเช้าและเย็น
- ❖ ติดมุ้งลวดหรือมุ้งตาข่ายป้องกันยุงเข้าบ้าน

6. มาตรการควบคุมเมื่อเกิดการระบาด

- ❖ พ่นสารเคมีกำจัดยุงตัวเต็มวัย
- ❖ ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ในชุมชนเร่งด่วน
- ❖ รมรงค์ทำความสะอาดครั้งใหญ่ (Big Cleaning Day)
- ❖ ให้ความรู้แก่ประชาชนผ่านสื่อต่างๆ และ อสม.


1.สถานการณ์โรคเลปโตสไปโรซิส ปี 2568

สถานการณ์โรคเลปโตสไปโรซิส ภาพรวมของประเทศไทย
นับจากวันที่ 1 ม.ค. - 24 เม.ย. 2568 (อัตราป่วยต่อแสนประชากร)



- ณ 24 เม.ย. 68 ประเทศไทย พบผู้ป่วยเลปโตฯ 900 ราย อัตราป่วย 1.386 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 10 ราย อัตราตาย 0.015 ต่อแสนประชากร
- เดือน เม.ย. 2568 พบผู้ป่วยรายใหม่ +131 ราย น้อยกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปี
- จังหวัดที่มีอัตราป่วยสูงสุด ได้แก่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน พบผู้ป่วยเลปโตฯ 50 ราย อัตราป่วย 20.74 ต่อแสนประชากร ส่วนใหญ่อายุ 60 ปีขึ้น
- จังหวัดที่พบผู้เสียชีวิต ได้แก่ น่าน 1 ราย นครศรีธรรมราช 1 ราย พัทลุง 1 ราย สงขลา 1 ราย ยะลา 1 ราย และศรีสะเกษ 5 ราย

สถานการณ์โรคเลปโตสไปโรซิส ภาพรวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นับจากวันที่ 1 ม.ค. - 24 เม.ย. 2568 (อัตราป่วยต่อแสนประชากร)



- ณ 8 เม.ย. 68 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบผู้ป่วยเลปโตฯ 170 ราย อัตราป่วย 0.78 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 5 ราย
- เดือน เม.ย. 2568 พบผู้ป่วยรายใหม่ +26 ราย น้อยกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปี
- จังหวัดที่มีอัตราป่วยสูงสุด และเสียชีวิต ได้แก่ จังหวัดศรีสะเกษ พบผู้ป่วยเลปโตฯ 51 ราย อัตราป่วย 3.51 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 5 ราย ส่วนใหญ่อายุ 60 ปีขึ้น




1.สถานการณ์โรคเลปโตสไปโรสิส ปี 2568

อัตราป่วยโรคเลปโตสไปโรสิส (1 ม.ค.-24 เม.ย. 68)

อำเภอ	ผู้ป่วยเพิ่ม เดือน เม.ย.	Median 5ปีย้อนหลัง	Median อัตราป่วย/ แสนประชากร	จำนวน ผู้ป่วย	อัตราป่วย/ แสน ประชากร	จำนวนตาย	อัตราป่วย ตาย	อัตราตาย ต่อแสน ประชากร	เพิ่ม/ลด ร้อยละ
อุทัยธานี	+2	63	42.17	17	11.39	2	11.77	1.34	ลดลง 72.99
โพธิ์ตาก	0	16	33.86	4	8.48	0	0	0	ลดลง 74.95
ราษีไศล	0	7	8.79	5	6.28	1	20	1.26	ลดลง 28.58
ยางชุมน้อย	0	3	8.36	2	5.58	1	50	2.79	ลดลง 33.22
เบญจลักษ์	+1	3	8.34	2	5.56	0	0	0	เพิ่มขึ้น 33.33
โนนคูณ	0	1	2.54	2	5.08	0	0	0	ลดลง 100
ห้วยทับทัน	0	7	16.59	2	4.75	0	0	0	ลดลง 71.36
กันทรารมย์	0	20	20.14	4	4.03	0	0	0	ลดลง 79.99
วังหิน	+1	7	13.85	2	3.96	0	0	0	ลดลง 71.40
ศรีร์คนะ	+1	9	16.95	2	3.77	0	0	0	ลดลง 77.76
ภูสิงห์	0	13	23.73	2	3.65	0	0	0	ลดลง 84.62
พยุห์	0	1	2.86	1	2.86	0	0	0	0.00
ปรางค์กู๋	0	15	22.69	1	1.51	0	0	0	ลดลง 93.35
เมืองศรีสะเกษ	+1	10	7.26	2	1.46	0	0	0	ลดลง 79.88
อุทุมพรพิสัย	0	8	7.64	1	0.96	1	100	0.96	ลดลง 87.44
ขุนหาญ	0	42	39.35	1	0.94	0	0	0	ลดลง 97.61
กันทรลักษ์	0	8	3.97	1	0.50	0	0	0	ลดลง 87.41
น้ำเกลี้ยง	0	4	9.01	0	0	0	0	0	ลดลง 100
บึงบูรพ์	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0
โพธิ์ศรีสุวรรณ	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0
เมืองจันทร์	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0
ศิลาลาด	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0
รวม	0	237	21.99	51	3.51	5	9.8	0.34	ลดลง 84.04

สถานการณ์โรคเลปโตสไปโรสิส จังหวัดศรีสะเกษปี 2568

ระหว่างวันที่ 1 ม.ค.- 24 เม.ย. 2568 กับค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง



- จังหวัดศรีสะเกษ พบผู้ป่วย 51 ราย อัตราป่วย 3.51 ต่อแสนประชากร ผู้ป่วยเสียชีวิต 5 ราย อันดับที่ 11 ของประเทศ และอันดับที่ 1 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- เดือน เม.ย. 2568 พบผู้ป่วยรายใหม่ +5 ราย น้อยกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปี
- อำเภอที่มีอัตราป่วย และเสียชีวิตสูงสุดได้แก่ อำเภออุทัยธานี อัตราป่วย 11.39 ต่อแสนประชากร อัตราตาย 1.34 ต่อแสนประชากร
- ส่วนใหญ่อายุ 60 ปีขึ้น อาชีพเกษตรกร
- ตั้งแต่ ม.ค. - เม.ย.68 มีแนวโน้มลดลง เมื่อเทียบกับ ม.ค. - เม.ย.67
- อำเภอที่มีผู้ป่วยเสียชีวิต อำเภออุทัยธานี 2 ราย , อำเภอราษีไศล 1 ราย , อำเภอขามเฒ่า 1 ราย ,และอำเภออุทุมพรพิสัย 1 ราย

2.ผลการดำเนินงานการลดป่วยและเสียชีวิตด้วยโรคเลปโตสไปโรสิส

ลำดับ

กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน

การประเมินผลงานตามวัตถุประสงค์หลัก



1

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนานุเคราะห์ทางสาธารณสุข ในการคัดกรอง เฝ้าระวัง ป้องกัน สืบสวน และควบคุมโรคเลปโตสไปโรสิส

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำโรงพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เข้าร่วมประชุมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนานุเคราะห์ทางสาธารณสุข ในการคัดกรอง เฝ้าระวัง ป้องกัน สืบสวน และควบคุมโรคเลปโตสไปโรสิส ครบทุกแห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 



2

การประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินอาการ การดูแลรักษา และการส่งต่อผู้ป่วยโรคเลปโตสไปโรสิส ของบุคลากรด้านสาธารณสุข จังหวัดศรีสะเกษ

1.สสจ. ศรีสะเกษ มีแผนจัดประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินอาการ การดูแลรักษา และการส่งต่อผู้ป่วยโรคเลปโตสไปโรสิส การจัดการผู้ป่วยรายกรณี ผ่านระบบ

Video conference ภายในเดือนมีนาคม 2568 

2.การจัดทำแนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคเลปโตสไปโรสิส ให้กับโรงพยาบาลทุกแห่ง 



ผ่าน



ไม่ผ่าน



อยู่ระหว่างดำเนินการ

2.ผลการดำเนินงานการลดป่วยและเสียชีวิตด้วยโรคเลปโตสไปโรสิส

ลำดับ	กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน	การประเมินผลงานตามวัตถุประสงค์หลัก
 3	การสอบสวน ควบคุมการระบาดของโรคเลปโตสไปโรสิส	1.เจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำ รพ.สต. จัดทำรายงานสอบสวนโรคเลปโตสไปโรสิส เสนอผู้บริหารทุกราย คิดเป็นร้อยละ 100%  2.มีการจัดทำโปสเตอร์ สื่อประชาสัมพันธ์ในการป้องกันโรคเลปโตสไปโรสิส ทุกเดือน  3.ระบบการสอดส่องผลพิกัดแหล่งโรค และการกระจายเชิงพื้นที่เกิดโรคเลปโตสไปโรสิส อยู่ระหว่างปรับปรุงพัฒนาระบบ 
 4	อัตราป่วยน้อยกว่า 10 ต่อแสนประชากร	1.ปี 2568 พบผู้ป่วยเลปโตสไปโรสิส จำนวน 51 ราย อัตราป่วย 3.51 ต่อแสนประชากร  2.มีแนวโน้มลดลง และจำนวนผู้ป่วยน้อยกว่าปี 2567 
 5	อัตราตายลดลง ไม่เกิน 0.1 ต่อแสนประชากร	ปี 2568 ผู้ป่วยเสียชีวิต 5 ราย อัตราตาย 0.34 ต่อแสนประชากร 

ตัวชี้วัด งานเลปโตสไปโรสิส Rabiesและไข้เลือดออก

ตัวชี้วัดที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน (ไตรมาส 1-2)	สถานะ
1	อัตราป่วยด้วยโรคเลปโตสไปโรสิสลดลงร้อยละ 25 (2.63ต่อประชากรแสนคน)จากค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี (2563-2567)	< ร้อยละ 25	Median = 21.99 ผู้ป่วย = 3.51 ลดลงร้อยละ 84.04	
2	อัตราตายด้วยโรคเลปโตสไปโรสิส ไม่เกินร้อยละ 1	< ร้อยละ 1	พบผู้ป่วยเสียชีวิต 5 ราย	



ผ่าน



ไม่ผ่าน



อยู่ระหว่างดำเนินการ



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

ตรวจจ้บเร็ว ตอบโต้ทัน ป้องกันได้

จบการนำเสนอ