



การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อที่สำคัญ
ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ เดือนตุลาคม 2568

กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
วันที่ 30 ตุลาคม 2568



สถานการณ์โรคเลปโตสไปโรซิส


อัตราป่วยโรคเลปโตสไปโรซิส (1 ม.ค.-20 ต.ค. 68)

อำเภอ	จำนวนผู้ป่วย	อัตราป่วย/แสนประชากร	จำนวนตาย	อัตราการตาย	อัตราตายต่อแสนประชากร
ปรางค์กู่	24.00	36.34	2.00	8.33	3.03
ขุนหาญ	37.00	34.72	0.00	0.00	0.00
ภูสิงห์	15.00	27.41	0.00	0.00	0.00
วังหิน	13.00	25.77	1.00	7.69	1.98
น้ำเกลี้ยง	11.00	24.79	1.00	9.09	2.25
ไพรบึง	11.00	23.31	0.00	0.00	0.00
เบญจลักษ์	8.00	22.23	1.00	12.50	2.78
โนนคูณ	8.00	20.30	2.00	25.00	5.08
พยุห์	7.00	20.01	1.00	14.29	2.86
ซุซันต์	28.00	18.76	2.00	7.14	1.34
ยางชุมน้อย	6.00	16.74	1.00	16.67	2.79
ห้วยทับทัน	6.00	14.24	0.00	0.00	0.00
ศรีรัตนะ	7.00	13.19	0.00	0.00	0.00
กันทรารมย์	10.00	10.08	0.00	0.00	0.00
กันทรลักษ์	18.00	8.98	0.00	0.00	0.00
ราษีไศล	7.00	8.80	1.00	14.29	1.26
เมืองศรีสะเกษ	10.00	7.29	0.00	0.00	0.00
เมืองจันทร์	1.00	5.64	0.00	0.00	0.00
ศิลาลาด	1.00	5.07	0.00	0.00	0.00
อุทุมพรพิสัย	5.00	4.79	1.00	20.00	0.96
โพธิ์ศรีสุวรรณ	1.00	4.23	0.00	0.00	0.00
บึงบูรพ์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ไม่ระบุ	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวม	236	16.25	13	5.51	0.895

สถานการณ์โรคเลปโตสไปโรซิส จังหวัดศรีสะเกษปี 2568

ระหว่างวันที่ 1 ม.ค.- 20 ตุลาคม 2568 กับค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง

จำนวนผู้ป่วยด้วยโรค Leptospirosis, Wei's Disease จำแนกรายเดือน จ.ศรีสะเกษ
เปรียบเทียบข้อมูลปี 2568 กับค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง



ณ 20 ต.ค. 68 จังหวัดศรีสะเกษ พบผู้ป่วย 236 ราย อัตราป่วย 16.25 ต่อแสนประชากร ผู้ป่วยเสียชีวิต 13 ราย อัตราป่วยตายร้อยละ 5.51 อันดับที่ 11 ของประเทศ และอันดับที่ 1 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เดือน ต.ค. 2568 พบผู้ป่วยรายใหม่ +50 ราย น้อยกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปี

อำเภอที่มีอัตราป่วยสูงสุด ได้แก่ อำเภอปรางค์กู่ อัตราป่วย 36.34 ต่อแสนประชากร

ส่วนใหญ่อายุ 60 ปีขึ้น อาชีพเกษตรกร


อำเภอที่มีผู้ป่วยเสียชีวิต อำเภอซุซันต์ 2 ราย , โนนคูณ 2 ราย , อำเภอราศีไศล 1 ราย , อำเภอยางชุมน้อย 1 ราย อำเภอเบญจลักษ์ 1 ราย ,อำเภอปรางค์กู่ 2 ราย ,อำเภอวังหิน 1 ราย ,อำเภอน้ำเกลี้ยง 1 ราย ,อำเภอพยุห์ 1 ราย และอำเภออุทุมพรพิสัย 1 ราย



มาตรการการขอความร่วมมือ

แนวทางการรักษาผู้ป่วยสงสัยเลปโตสไปโรซิส สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

จังหวัดศรีสะเกษ



V1 พัฒนโดย พญ.วิธิกุล เต็มเสียง,โรงพยาบาลศรีสะเกษ

- 1.ให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในจังหวัดศรีสะเกษนำแนวทางการรักษาผู้ป่วยสงสัยเลปโตสไปโรซิส สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล มาใช้เป็นแนวทางในการรักษาโรคเลปโตสไปโรซิส
2. มีการสำรองยา Doxycyclin ให้บริการรักษาเบื้องต้น ในระดับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
3. สื่อสารความเสี่ยงกับประชาชนให้มีความรู้ และตระหนักถึงความรุนแรงของโรคเลปโตสไปโรซิส

โรคฉี่หนู
โรคเลปโตสไปโรซิส (Leptospirosis)

โรคฉี่หนู เป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย **เลปโตสไปรา** (อังกฤษ: Leptospira) มี พญ. เป็นแหล่งรังโรคที่สำคัญที่สุด และสัตว์เลี้ยง เช่น โค กระบือ สุกร สุนัข โดยเชื้อจะอยู่ในปัสสาวะของสัตว์

การติดต่อ

- ติดต่อโดยตรง**: สัมผัสกับปัสสาวะหรืออวัยวะของสัตว์ ที่ติดเชื้อโดยตรง
- ติดต่อทางอ้อม**: สัมผัสกับน้ำ หรือ ดิน ที่ปนเปื้อนเชื้อ เช่น อาบน้ำในบึงหรือที่สกปรก

อาการ

มีไข้เฉียบพลัน ปวดศีรษะ เมื่อยตามตัว โดยเฉพาะที่มือและโคนขา คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย ตาแดง

ผู้เสี่ยงต่อการติดเชื้อ เกษตรกร ชาวไร่ ชาวไร่ สัตวแพทย์ ชุมชนแออัด นักท่องเที่ยว ผู้ล่าสัตว์

การป้องกัน

- ✓ กำจัดหนูรอบๆบ้าน และไม่สัมผัสสัตว์ที่เปื้อนพาหะ
- ✓ สวมชุดป้องกันไม่ให้เชื้อโรคเข้าสู่ผิวหนัง เช่น รองเท้าบูท
- ✓ หลีกเลี่ยงการทำงานในน้ำ หรือ ต้องลุยน้ำลุยโคลน เป็นเวลานาน
- ✓ รับทำความสะอาดร่างกายโดยเร็ว หากลงไปในพื้นที่ต้องต้องสงสัย
- ✓ กินอาหารปรุงสุกใหม่ อาหารที่ห่อหุ้มพลาสติกให้ปิดสนิท ผัก ผลไม้ ควรล้างให้สะอาดหลายๆครั้ง ก่อนนำมารับประทาน



การป้องกันเฝ้าระวังควบคุมโรคมาลาเรียกำลังพลตามแนวชายแดน



ตรวจ คัดกรอง ค้นหา ผู้ป่วยในกลุ่ม
ทหารหาเชื้อมาลาเรีย ด้วยชุดตรวจเร็ว
RDT



ควบคุมโรคด้วยการพ่น หมอกควัน
ประจำฐานทหาร



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

ตรวจจ้บเร็ว ตอบโต้ทัน ป้องกันได้

จบการนำเสนอ