

วาระประชุมกรรมการจังหวัดศรีสะเกษ

เดือน ตุลาคม 2568

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

วาระนำเสนอจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

- โรคติดต่อที่สำคัญในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ เดือน ตุลาคม 2568 (นำเสนอแบบสไลด์)
 - สถานการณ์โรคเลปโตสไปโรซิส
 - สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่
 - สถานการณ์โรคติดต่อทางเดินอาหารและน้ำ

กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

ประจำเดือน ตุลาคม 2568

1. โรคติดต่อที่สำคัญในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ (นำเสนอแบบสไลด์)

1.1 สถานการณ์โรคเลปโตสไปโรซิส

สถานการณ์โรคเลปโตสไปโรซิส (โรคฉี่หนู) ภาพรวมของประเทศไทย นับจากวันที่ 1 มกราคม – 20 ตุลาคม 2568 พบผู้ป่วย 3,429 ราย อัตราป่วย 5.28 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 45 ราย อัตราตาย 0.069 ต่อแสนประชากร กลุ่มอายุที่ป่วยมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ อายุ 60 ปีขึ้นไป จำนวน 1,013 ราย รองลงมา คือกลุ่มอายุ อายุ 50-59 ปี และ 40-49 ปี จำนวน 671 และ 517 รายตามลำดับ สัญชาติไทย ร้อยละ 94 จังหวัดที่มีอัตราป่วยโรคเลปโตสไปโรซิสสูงสุด 10 อันดับแรก ได้แก่ แม่ฮ่องสอน น่าน ระนอง ตรัง พังงา นครศรีธรรมราช ยะลา เชียงราย สุราษฎร์ธานี และสงขลา ตามลำดับ ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 จังหวัดที่มีอัตราป่วยโรคเลปโตสไปโรซิสสูงสุด 10 อันดับแรก

ลำดับ	จังหวัด	จำนวนผู้ป่วย	เสียชีวิต	อัตราป่วยต่อแสนประชากร	อัตราตาย	อัตราป่วยตาย
1	แม่ฮ่องสอน	149.00	0.00	61.81	0.00	0.00
2	น่าน	197.00	2.00	41.67	0.42	1.02
3	ระนอง	72.00	0.00	40.21	0.00	0.00
4	ตรัง	166.00	2.00	26.09	0.31	1.20
5	พังงา	58.00	0.00	22.07	0.00	0.00
6	นครศรีธรรมราช	308.00	8.00	20.00	0.52	2.60
7	ยะลา	104.00	2.00	19.27	0.37	1.92
8	เชียงราย	214.00	0.00	18.37	0.00	0.00
9	สุราษฎร์ธานี	183.00	2.00	17.26	0.19	1.09
10	สงขลา	238.00	5.00	16.83	0.35	2.10
รวม		3,429	45	5.28	0.069	1.31

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2568 กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

สถานการณ์โรคเลปโตสไปโรซิส (โรคฉี่หนู) ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 20 ตุลาคม 2568 พบผู้ป่วยเลปโตสไปโรซิส จำนวน 962 ราย อัตราป่วย 4.43 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 21 ราย อัตราตาย 0.097 ต่อแสนประชากร จังหวัดที่มีอัตราป่วยสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ ศรีสะเกษ สุรินทร์ มุกดาหาร อุบลราชธานี และกาฬสินธุ์

ตารางที่ 2 จังหวัดที่มีอัตราป่วยโรคเลปโตสไปโรซิส สูงสุด 10 อันดับแรก ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ลำดับ	จังหวัด	จำนวนผู้ป่วย	เสียชีวิต	อัตราป่วยต่อแสนประชากร	อัตรามตาย	อัตราป่วยตาย
1	ศรีสะเกษ	236.00	13.00	16.25	0.90	5.51
2	สุรินทร์	164.00	0.00	11.96	0.00	0.00
3	มุกดาหาร	24.00	0.00	6.91	0.00	0.00
4	อุบลราชธานี	114.00	2.00	6.14	0.11	1.75
5	กาฬสินธุ์	50.00	3.00	5.15	0.31	6.00
6	มหาสารคาม	46.00	2.00	4.87	0.21	4.35
7	ร้อยเอ็ด	61.00	0.00	4.73	0.00	0.00
8	อุดรธานี	64.00	0.00	4.12	0.00	0.00
9	อำนาจเจริญ	15.00	0.00	4.00	0.00	0.00
10	เลย	23.00	0.00	3.64	0.00	0.00
รวม		962	21	4.43	0.097	2.18

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2568 กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

จังหวัดศรีสะเกษ มีอัตราป่วยด้วยโรคเลปโตสไปโรซิสสูงสุดเป็นอันดับที่ 11 ของประเทศ อันดับที่ 1 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และอันดับที่ 1 ของเขตสุขภาพที่ 10 ดังตารางที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 20 ตุลาคม 2568 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีรายงานผู้ป่วยโรคเลปโตสไปโรซิส (โรคฉี่หนู) จำนวนทั้งสิ้น 236 ราย อัตราป่วย 16.25 ต่อประชากรแสนคน ผู้เสียชีวิต 13 ราย อัตราตาย 0.895 ต่อแสนประชากร พบกลุ่มอายุที่มีอัตราป่วยสูงสุดคือ กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป จำนวน 87 ราย รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 50-59 ปี, 40-49 ปี และ 30-39 ปี จำนวน 64, 39 และ 27 ราย ตามลำดับ อำเภอที่มีอัตราป่วยสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ อำเภอบางแก้ว อำเภอขุขันธ์ อำเภอภูสิงห์ อำเภอวังหิน และอำเภอน้ำเกลี้ยง ดังตารางที่ 3


ตารางที่ 3 อัตราป่วยโรคเลปโตสไปโรซิส แยกรายอำเภอ ในจังหวัดศรีสะเกษ

ลำดับ	จังหวัด	จำนวนผู้ป่วย	เสียชีวิต	อัตราป่วยต่อแสนประชากร	อัตรามตาย	อัตราป่วยตาย
1	บางแก้ว	24.00	2.00	36.34	3.03	8.33
2	ขุขันธ์	37.00	0.00	34.72	0.00	0.00
3	ภูสิงห์	15.00	0.00	27.41	0.00	0.00
4	วังหิน	13.00	1.00	25.77	1.98	7.69
5	น้ำเกลี้ยง	11.00	1.00	24.79	2.25	9.09
6	ไพรบึง	11.00	0.00	23.31	0.00	0.00
7	เบญจลักษ์	8.00	1.00	22.23	2.78	12.50
8	โนนคูณ	8.00	2.00	20.30	5.08	25.00
9	พยุห์	7.00	1.00	20.01	2.86	14.29
10	ขุขันธ์	28.00	2.00	18.76	1.34	7.14
11	ยางชุมน้อย	6.00	1.00	16.74	2.79	16.67
12	ห้วยทับทัน	6.00	0.00	14.24	0.00	0.00
13	ศรีรัตนะ	7.00	0.00	13.19	0.00	0.00
14	กันทรารมย์	10.00	0.00	10.08	0.00	0.00
15	กันทรลักษ์	18.00	0.00	8.98	0.00	0.00
16	ราษีไศล	7.00	1.00	8.80	1.26	14.29
17	เมืองศรีสะเกษ	10.00	0.00	7.29	0.00	0.00
18	เมืองจันทร์	1.00	0.00	5.64	0.00	0.00
19	ศีลาสาท	1.00	0.00	5.07	0.00	0.00

20	อุทุมพรพิสัย	5.00	1.00	4.79	0.96	20.00
21	โพธิ์ศรีสุวรรณ	1.00	0.00	4.23	0.00	0.00
22	บึงบูรพ์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	ไม่ระบุ	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวม		236	13	16.25	0.895	5.51


หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2568 กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

ภาพที่ 1 จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคเลปโตสไปโรซิส พ.ศ.2567 – 2568 ในจังหวัดศรีสะเกษ



ปี 2568 มีแนวโน้มพบผู้ป่วยโรคเลปโตสไปโรซิน้อยกว่าปี 2567 แต่ยังเกินค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง โดยพบผู้ป่วยเลปโตสไปโรซิสตั้งแต่เดือนมกราคม- กันยายน 2568 จำนวน 21, 7, 19, 17, 16, 16, 24, 38, 33 และ 50 ราย ตามลำดับ สูงกว่าค่ามัธยฐานรายเดือน และยังต่ำกว่าข้อมูลผู้ป่วยรายเดือน ในปี 2567

รูปภาพที่ 2 พื้นที่เกิดโรคเลปโตสไปโรซิสแยกตามอำเภอ



หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2568 กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

จากรูปภาพที่ 2 จะเห็นได้ว่า พื้นที่การเกิดโรคเลปโตสไปโรซิสจะต้องมีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ เกษตรกรปลูกข้าว และอาชีพประมงพื้นบ้าน ได้เฝ้าระวัง ป้องกัน และสังเกตตนเอง เพื่อให้สามารถเข้าถึงระบบการรักษาได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอำเภอทางโซนเหนือ และโซนใต้ของจังหวัดศรีสะเกษ ที่พบการระบาดของโรคเลปโตสไปโรซิสสูง

1.2 โรคไข้หวัดใหญ่ (Influenza)

สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ ภาพรวมประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 21 ตุลาคม 2568 พบผู้ป่วย 796,184 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 1,226.56 ต่อประชากรแสนคน เสียชีวิต 74 ราย คิดเป็นอัตราตาย 0.11 ต่อประชากรแสนคน อัตราป่วยตายเป็นร้อยละ 0.010 กลุ่มอายุที่ป่วยมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ อายุ 5-9 ปี, 0-4 ปี และ 10-14 ปี อัตราป่วยเท่ากับ 4,196.1, 3,437.1 และ 2,768.7 ต่อประชากรแสนคน ตามลำดับ จังหวัดที่มีอัตราป่วยโรคไข้หวัดใหญ่สูงสุด 10 อันดับแรก ได้แก่ ภูเก็ต, ชลบุรี, กรุงเทพมหานคร, ตราด, ระยอง, จันทบุรี, นนทบุรี, สมุทรปราการ, นครปฐม และปทุมธานี อัตราป่วยเท่ากับ 2,936.0, 2,435.5, 2,240.3, 2,146.4, 2,088.9, 2,080.1, 1,943.2, 1,925.6, 1,701.9 และ 1,672.6 ต่อประชากรแสนคน ตามลำดับ ดังตารางที่ 4

ตารางที่ 4 จังหวัดที่มีอัตราป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ 10 อันดับแรก

ลำดับ	จังหวัด	จำนวนผู้ป่วย	เสียชีวิต	อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน	อัตราตาย	อัตราป่วยตาย
1	ภูเก็ต	11,889	1	2,936.0	0.25	0.008
2	ชลบุรี	37,85	2	2,435.5	0.13	0.005
3	กรุงเทพมหานคร	120,113	3	2,240.3	0.06	0.002
4	ตราด	4,674	0	2,146.4	0.00	0.000
5	ระยอง	15,539	1	2,088.9	0.13	0.006
6	จันทบุรี	11,034	0	2,080.1	0.00	0.000
7	นนทบุรี	24,636	0	1,943.2	0.00	0.000
8	สมุทรปราการ	25,670	1	1,925.6	0.08	0.004
9	นครปฐม	15,445	1	1,701.9	0.11	0.006
10	ปทุมธานี	19,730	3	1,672.6	0.25	0.015

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2568 กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค


สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 21 ตุลาคม 2568 พบผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ จำนวน 218,975 ราย อัตราป่วย 1,008.5 ต่อประชากรแสนคน ผู้ป่วยเสียชีวิต 35 ราย อัตราตาย 0.16 ต่อประชากรแสนคน อัตราป่วยตายเป็นร้อยละ 0.016 กลุ่มอายุที่ป่วยมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ อายุ 5-9 ปี, 0-4 ปี และ 10-14 ปี อัตราป่วย 3,809.7, 3,294.8 และ 2,396.7 ต่อประชากรแสนคน ตามลำดับ จังหวัดที่มีอัตราป่วยสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ อุบลราชธานี, นครราชสีมา, หนองคาย, หนองบัวลำภู และสุรินทร์ อัตราป่วย 1,413.5, 1,394.5, 1,219.0, 1,174.8 และ 1,091.3 ต่อประชากรแสนคน ตามลำดับ จังหวัดศรีสะเกษ มีอัตราป่วยด้วยโรคไข้หวัดใหญ่เป็นอันดับที่ 52 ของประเทศ อันดับที่ 13 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และอันดับที่ 1 ของเขตสุขภาพที่ 4 ดังตารางที่ 5

ตารางที่ 5 จังหวัดที่มีอัตราป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ สูงสุด 10 อันดับแรก ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ลำดับ	จังหวัด	จำนวนผู้ป่วย	เสียชีวิต	อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน	อัตราตาย	อัตราป่วยตาย
1	อุบลราชธานี	26,245	6	1,143.5	0.32	0.023
2	นครราชสีมา	36,553	22	1,394.5	0.84	0.060
3	หนองคาย	6,218	0	1,219.0	0.00	0.000
4	หนองบัวลำภู	5,961	0	1,174.8	0.00	0.000
5	สุรินทร์	14,961	1	1,091.3	0.07	0.007
6	ขอนแก่น	18,973	0	1,065.9	0.00	0.000
7	นครพนม	7,332	0	1,026.8	0.00	0.000
8	ยโสธร	5,278	0	993.3	0.00	0.000
9	มุกดาหาร	3,435	0	988.3	0.00	0.000
10	บุรีรัมย์	15,272	2	970.5	0.13	0.013

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2568 กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

จังหวัดศรีสะเกษ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 21 ตุลาคม 2568 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีรายงานผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ จำนวนทั้งสิ้น 13,027 ราย อัตราป่วย 896.9 ต่อประชากรแสนคน พบผู้ป่วยเสียชีวิต 1 อัตราตาย 0.069 ต่อประชากรแสนคน อัตราป่วยตายร้อยละ 0.008 กลุ่มอายุที่ป่วยมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ อายุ 5-9 ปี, 0-4 ปี และ 10-14 ปี อัตราป่วย 3,135.3, 3,000.9 และ 1,958.6 ต่อประชากรแสนคน ตามลำดับ อำเภอที่มีอัตราป่วยสูงสุด 5 อันดับแรก คือ เมืองศรีสะเกษ, บึงบูรพ์, ไพรบึง, วังหิน และเบญจลักษณ์ ตามลำดับ อัตราป่วย 2,899.4, 2,679.4, 1,862.9, 1,308.3 และ 1,255.8 ต่อประชากรแสนคน ตามลำดับ ดังตารางที่ 6



ตารางที่ 6 อัตราป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ แยกรายอำเภอ ในจังหวัดศรีสะเกษ

ลำดับ	อำเภอ	จำนวนผู้ป่วย	เสียชีวิต	อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน	อัตราตาย	อัตราป่วยตาย
1	เมืองศรีสะเกษ	3,980	0	2,899.4	0.00	0.000
2	บึงบูรพ์	280	0	2,679.4	0.00	0.000
3	ไพรบึง	879	0	1,862.9	0.00	0.000
4	วังหิน	660	0	1,308.3	0.00	0.000
5	เบญจลักษ์	452	0	1,255.8	0.00	0.000
6	ขุนหาญ	1,199	0	1,125.2	0.00	0.000
7	กันทรารมย์	917	0	924.7	0.00	0.000
8	โพธิ์ศรีสุวรรณ	186	0	786.4	0.00	0.000
9	โนนคูณ	306	0	776.6	0.00	0.000
10	ขุขันธ์	992	0	664.8	0.00	0.000
11	ราษีไศล	483	0	606.9	0.00	0.000
12	ปรางค์กู่	397	1	601.1	1.514	0.161
13	กันทรลักษ์	1,184	0	590.6	0.00	0.000
14	ภูสิงห์	239	0	436.7	0.00	0.000
15	อุทุมพรพิสัย	424	0	406.1	0.00	0.000
16	ยางชุมน้อย	119	0	332.0	0.00	0.000
17	ห้วยทับทัน	138	0	327.4	0.00	0.000
18	พยุห์	80	0	228.7	0.00	0.000
19	ศรีรัตนะ	62	0	116.8	0.00	0.000
20	ศิลาลาด	22	0	111.6	0.00	0.000
21	เมืองจันทร์	11	0	62.0	0.00	0.000
22	น้ำเกลี้ยง	17	0	38.3	0.00	0.000
รวม		13,027	1	896.9	0.069	0.008

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2568 กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค


มาตรการควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่

1. ขอความร่วมมือพื้นที่ดำเนินการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่ และเตรียมความพร้อมในการป้องกันควบคุมการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ ตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข

2. สื่อสารประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องโรค การป้องกัน ควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่

คำแนะนำในการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่

- ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ำและสบู่ หรือใช้แอลกอฮอล์เจลทำความสะอาดมือ ในกรณีที่มือไม่เปื้อน
- ไม่ใช้สิ่งของ เช่น แก้วน้ำ หลอดดูดน้ำ ช้อนอาหาร ผ้าเช็ดมือ ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดตัว เป็นต้น ร่วมกับผู้อื่น
- ไม่ควรคลุกคลีใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่มีอาการไข้หวัด



จังหวัดศรีสะเกษ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 21 ตุลาคม 2568 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มี รายงานผู้ป่วยโรค Mushroom poisoning จำนวนทั้งสิ้น 308 ราย อัตราป่วย 21.205 ต่อประชากรแสนคน กลุ่มอายุที่ป่วยมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ อายุ 60 ปีขึ้นไป อายุ 50-59 ปี และ 40-49 ปี อัตราป่วย 52.298, 36.849 และ 13.137 ต่อแสนประชากร ตามลำดับ อำเภอที่มีอัตราป่วยสูงสุด 5 อันดับแรก คือ กันทรลักษ์ ขุขันธ์ ราชังไสล ขุนหาญ และไพรบึง ตามลำดับ อัตราป่วย 23.45, 20.10, 35.18, 22.52 และ 48.74 ต่อ ประชากรแสนคน ตามลำดับ ดังตารางที่ 8

ตารางที่ 8 อัตราป่วยโรคอาหารเป็นพิษจากเห็ดพิษ แยกรายอำเภอ ในจังหวัดศรีสะเกษ

ลำดับ	จังหวัด	จำนวนผู้ป่วย	เสียชีวิต	อัตราป่วยต่อแสนประชากร	อัตราตาย	อัตราป่วยตาย
1	กันทรลักษ์	47.00	1	23.45	0.50	2.128
2	ขุขันธ์	30.00	0	20.10	0.00	0.000
3	ราชังไสล	28.00	0	35.18	0.00	0.000
4	ขุนหาญ	24.00	0	22.52	0.00	0.000
5	ไพรบึง	23.00	0	48.74	0.00	0.000
6	ปรังค์กู๋	20.00	0	30.28	0.00	0.000
7	เมืองศรีสะเกษ	19.00	0	13.84	0.00	0.000
8	อุทุมพรพิสัย	18.00	0	17.24	0.00	0.000
9	ภูสิงห์	16.00	0	29.23	0.00	0.000
10	ศีลาลาด	14.00	0	71.02	0.00	0.000
11	วังหิน	12.00	0	23.79	0.00	0.000
12	ยางชุมน้อย	10.00	0	27.90	0.00	0.000
13	กันทรารมย์	8.00	0	8.07	0.00	0.000
14	โนนคูณ	7.00	0	17.77	0.00	0.000
15	พยุห์	7.00	0	20.01	0.00	0.000
16	โพธิ์ศรีสุวรรณ	6.00	0	25.37	0.00	0.000
17	เบญจลักษ์	4.00	0	11.11	0.00	0.000
18	ศรีรัตนะ	4.00	0	7.54	0.00	0.000
19	น้ำเกลี้ยง	3.00	0	6.76	0.00	0.000
20	บึงบูรพ์	3.00	0	28.71	0.00	0.000
21	ห้วยทับทัน	3.00	0	7.12	0.00	0.000
22	เมืองจันทร์	2.00	0	11.28	0.00	0.000
รวม		308	1	21.205	0.069	0.325

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2568 กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

การระบาดของโรคอาหารเป็นจากการรับประทานปลาจ่อม อำเภอชุมพวง

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2568 เวลา 13.00 น.งานควบคุมโรคติดต่อ โรงพยาบาลชุมพวง ได้รับแจ้งจากแผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลชุมพวง ว่ามีผู้ป่วยด้วยโรคอาหารเป็นพิษจากการรับประทานปลาจ่อม กุ้งจ่อม จำนวน 14 ราย โดยเริ่มพบผู้ป่วยรายแรกที่มาใช้บริการตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2568 เป็นคนในเขตอำเภอชุมพวงทั้งหมด เป็นผู้ป่วยนอก 11 ราย admit 3 จากการตรวจสอบพบว่าเหตุการณ์นี้เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค เนื่องจากเป็นโรคที่ต้องสอบสวนเนื่องจากมีการระบาดของโรค ดังนั้นงานควบคุมโรคติดต่อ โรงพยาบาลชุมพวงได้ประสานต่อหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อตำบลชุมพวงหาข้อมูลเพิ่มเติมและออกสอบสวนโรค เพื่อยืนยันการระบาดตามบุคคล เวลา สถานที่ คำหาสาเหตุและปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรค ดำเนินการมาตรการ ควบคุมโรค และหาแนวทางในการควบคุมป้องกันการระบาดของโรคไม่ให้เกิดการแพร่กระจายโรคต่อไป ในวันที่ 15 ตุลาคม 2568 เวลา 13.30 น.

ผลการสอบสวน พบผู้ป่วยทั้งหมด 14 ราย เป็นเพศชาย 6 ราย เพศหญิง 8 ราย ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร อาการและอาการแสดงที่พบมากที่สุด คือ ปวดมวนท้อง อาเจียน ถ่ายเหลว เหนื่อยเพลีย ไม่มีผู้เสียชีวิต จากการสอบสวนอาหารที่สงสัยคือปลาจ่อม กุ้งจ่อม เนื่องจากคนไข้ทั้งหมดได้ซื้อจากแผงขายอาหารที่ตลาดสดตอนเช้าในอำเภอชุมพวงซึ่งเป็นอาหารที่มาจากแหล่งเดียวกัน แม้ค้าอาศัยอยู่บ้านเลขที่ ๕๗/๑ หมู่ ๔ ตำบลชุมพวง ซึ่งเป็นคนผลิตปลาจ่อมกุ้งจ่อมเอง งานควบคุมโรคติดต่อโรงพยาบาลชุมพวงได้ประสานต่อหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อตำบลชุมพวงหาข้อมูลเพิ่มเติมและออกสอบสวนโรค เพื่อยืนยันการระบาดตามบุคคล เวลา สถานที่ คำหาสาเหตุและปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรค ดำเนินการมาตรการ ควบคุมโรค และหาแนวทางในการควบคุมป้องกันการระบาดของโรคไม่ให้เกิดการแพร่กระจายโรคต่อไป ในวันที่ 15 ตุลาคม 2568 เวลา 13.30 น.

มาตรการที่ดำเนินการควบคุมแล้ว

1. ลงพื้นที่สอบสวนโรคเพื่อยืนยันการเกิดโรค ยืนยันการระบาด และควบคุมโรค
2. แจ้งผู้นำชุมชน อสม. ช่วยประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และคำแนะนำกับประชาชนเรื่องอาหารเป็นพิษ
3. เจ้าหน้าที่สาธารณสุขให้สุศึกษาความรู้ประชาชนในพื้นที่เรื่องการสังเกตอาการและติดตามอาการอย่างต่อเนื่องหลังการรับประทานอาหารสุกๆ ดิบๆ โดยเฉพาะในช่วงอากาศร้อน สังเกตสภาพของปลาจ่อม เช่น กลิ่น สี เนื้อสัมผัส และน้ำปลาจ่อม เลือกซื้ออาหารจากแหล่งที่สะอาด ถูกสุขอนามัย
4. เน้นย้ำผู้ผลิตให้รักษาความสะอาด สวมถุงมือขณะปรุงอาหาร และควบคุมสุขอนามัยในทุกขั้นตอนการผลิต
5. เก็บตัวอย่างอาหารส่งตรวจ

รูปภาพประกอบการสอบสวนโรค



