

กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ  
ประจำเดือน มกราคม 2569

1. โรคติดต่อที่สำคัญในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ เดือน มกราคม 2569

1.1 โรคไข้หวัดใหญ่ (Influenza)

สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ (Influenza) ภาพรวมของประเทศไทย นับจากวันที่ 1 มกราคม – 19 มกราคม 2569 พบผู้ป่วย 36,488 ราย อัตราป่วย 56.21 ต่อแสนประชากร กลุ่มอายุที่ป่วยมากที่สุด 3 อันดับแรกคือ อายุ 5 - 9 ปี จำนวน 6,667 ราย รองลงมาคือกลุ่มอายุ อายุ 20-29 ปี และ 30-39 ปี จำนวน 5,501 และ 5,339 รายตามลำดับ สัญชาติไทย ร้อยละ 90 จังหวัดที่มีอัตราป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ (Influenza) สูงสุด 10 อันดับแรก ได้แก่ พะเยา ลำปาง น่าน แพร่ พิจิตรโลก เชียงใหม่ ลำพูน อุตรดิตถ์ แม่ฮ่องสอน และภูเก็ต ตามลำดับ ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 จังหวัดที่มีอัตราป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ (Influenza) สูงสุด 10 อันดับแรก

| ลำดับ | จังหวัด    | จำนวนผู้ป่วย | เสียชีวิต | อัตราป่วยต่อแสนประชากร | อัตราราย | อัตราป่วยตาย |
|-------|------------|--------------|-----------|------------------------|----------|--------------|
| 1     | พะเยา      | 1,090        | 0         | 237.06                 | 0        | 0            |
| 2     | ลำปาง      | 1,066        | 0         | 148.54                 | 0        | 0            |
| 3     | น่าน       | 700          | 0         | 148.07                 | 0        | 0            |
| 4     | แพร่       | 616          | 0         | 142.92                 | 0        | 0            |
| 5     | พิจิตรโลก  | 944          | 0         | 112.23                 | 0        | 0            |
| 6     | เชียงใหม่  | 1,791        | 0         | 110.16                 | 0        | 0            |
| 7     | ลำพูน      | 428          | 0         | 107.93                 | 0        | 0            |
| 8     | อุตรดิตถ์  | 422          | 0         | 95.40                  | 0        | 0            |
| 9     | แม่ฮ่องสอน | 226          | 0         | 93.75                  | 0        | 0            |
| 10    | ภูเก็ต     | 373          | 0         | 92.11                  | 0        | 0            |
|       | รวม        | 36,488       | 0         | 56.21                  | 0        | 0            |

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 19 มกราคม 2569 กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ (Influenza) ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 19 มกราคม 2569 พบผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ (Influenza) จำนวน 9,468 ราย อัตราป่วย 43.61 ต่อแสนประชากร จังหวัดที่มีอัตราป่วยสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ อุบลราชธานี นครราชสีมา ยโสธร หนองบัวลำภู และมุกดาหาร

ตารางที่ 2 จังหวัดที่มีอัตราป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ (Influenza) สูงสุด 10 อันดับแรก ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

| ลำดับ | จังหวัด     | จำนวนผู้ป่วย | เสียชีวิต | อัตราป่วยต่อแสนประชากร | อัตราราย | อัตราป่วยตาย |
|-------|-------------|--------------|-----------|------------------------|----------|--------------|
| 1     | อุบลราชธานี | 1,389        | 0         | 74.81                  | 0        | 0            |
| 2     | นครราชสีมา  | 1,803        | 0         | 68.78                  | 0        | 0            |
| 3     | ยโสธร       | 314          | 0         | 59.10                  | 0        | 0            |
| 4     | หนองบัวลำภู | 294          | 0         | 57.94                  | 0        | 0            |
| 5     | มุกดาหาร    | 183          | 0         | 52.65                  | 0        | 0            |
| 6     | กาฬสินธุ์   | 460          | 0         | 47.35                  | 0        | 0            |
| 7     | ขอนแก่น     | 821          | 0         | 46.12                  | 0        | 0            |
| 8     | อำนาจเจริญ  | 169          | 0         | 45.10                  | 0        | 0            |
| 9     | ร้อยเอ็ด    | 575          | 0         | 44.58                  | 0        | 0            |
| 10    | สุรินทร์    | 554          | 0         | 40.41                  | 0        | 0            |
| รวม   |             | 9,468        | 0         | 43.61                  | 0        | 0            |

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 19 มกราคม 2569 กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ (Influenza) ในเขตสุขภาพที่ 10 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 19 มกราคม 2569 พบผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ (Influenza) จำนวน 2,474 ราย อัตราป่วย 54.22 ต่อแสนประชากร จังหวัดที่มีอัตราป่วยสูงสุด ได้แก่ อุบลราชธานี ยโสธร มุกดาหาร อำนาจเจริญ และศรีสะเกษ ตามลำดับ ดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 จังหวัดที่มีอัตราป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ (Influenza) สูงสุด 10 อันดับแรก ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

| ลำดับ | จังหวัด     | จำนวนผู้ป่วย | เสียชีวิต | อัตราป่วยต่อแสนประชากร | อัตราราย | อัตราป่วยตาย |
|-------|-------------|--------------|-----------|------------------------|----------|--------------|
| 1     | อุบลราชธานี | 1,389        | 0         | 74.81                  | 0        | 0            |
| 2     | ยโสธร       | 314          | 0         | 59.10                  | 0        | 0            |
| 3     | มุกดาหาร    | 183          | 0         | 52.65                  | 0        | 0            |
| 4     | อำนาจเจริญ  | 169          | 0         | 45.10                  | 0        | 0            |
| 5     | ศรีสะเกษ    | 419          | 0         | 28.85                  | 0        | 0            |
| รวม   |             | 9,468        | 0         | 43.61                  | 0        | 0            |


หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 19 มกราคม 2569 กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

จังหวัดศรีสะเกษ มีอัตราป่วยด้วยโรคไข้หวัดใหญ่ (Influenza) เป็นอันดับที่ 60 ของประเทศ อันดับที่ 16 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และอันดับที่ 5 ของเขตสุขภาพที่ 10 ดังตารางที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม –

**ตารางที่ 3 อัตราป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ (Influenza) แยกรายอำเภอ ในจังหวัดศรีสะเกษ**

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 19 มกราคม 2569 กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

ภาพที่ 1 จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้หวัดใหญ่ (Influenza) พ.ศ.2569 ในจังหวัดศรีสะเกษ



ปี 2569 มีแนวโน้มพบผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ (Influenza) น้อยกว่าปี 2568 แต่ยังเกินค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง โดยพบผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ (Influenza) ในเดือนมกราคม จำนวน 419 ราย สูงกว่าค่ามัธยฐานรายเดือน และยังต่ำกว่าข้อมูลผู้ป่วยรายเดือน ในปี 2568

### มาตรการควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่

1. ขอความร่วมมือพื้นที่ดำเนินการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่ และเตรียมความพร้อมในการป้องกัน ควบคุมการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ ตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข
2. สื่อสารประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องโรค การป้องกัน ควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่

### คำแนะนำในการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่

1. ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ำและสบู่ หรือใช้แอลกอฮอล์เจลทำความสะอาดมือ ในกรณีที่มือไม่เปื้อน
2. ไม่ใช้สิ่งของ เช่น แก้วน้ำ หลอดดูดน้ำ ช้อนอาหาร ผ้าเช็ดมือ ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดตัว เป็นต้น ร่วมกับผู้อื่น
3. ไม่ควรคลุกคลีใกล้ชิดกับผู้ที่มีอาการไข้หวัด
4. กินอาหารที่มีประโยชน์ เน้นผัก ผลไม้ นม ไข่ กินอาหารปรุงสุกใหม่ๆ และใช้ช้อนกลาง นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ และออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
5. ควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่ที่มีผู้คนแออัด และอากาศถ่ายเทไม่ดีเป็นเวลานานโดยไม่จำเป็น
6. ติดตามคำแนะนำอื่น ๆ ของกองควบคุมโรคติดต่ออย่างใกล้ชิด

## 1.2 โรคพิษสุนัขบ้า

สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 19 มกราคม 2569 ไม่พบผู้ป่วยเสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่ประเทศไทย พบรายงานผลบวกของโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ 15 ตัว คิดเป็นร้อยละ 13.76 ของตัวอย่างทั้งหมด 109 ตัว จาก 77 จังหวัด พบสูงสุดในจังหวัดศรีสะเกษคิดเป็นร้อยละ 26.67 (4/15) ตรวจพบมากที่สุด ใน สุนัข คิดเป็นร้อยละ 66.67 (10/15) รองลงมาคือ โค คิดเป็นร้อยละ 20.00 (3/15) และ กระบือ คิดเป็นร้อยละ 6.67 (1/15) และม้า คิดเป็นร้อยละ 6.67 (1/15) นอกจากนี้ยังพบว่าตัวอย่างที่สัตว์ติดเชื้อที่พบผลบวก พบว่า เป็นสัตว์ที่มีเจ้าของร้อยละ 53.33 ไม่มีเจ้าของร้อยละ 20 และไม่ทราบว่ามีเจ้าของร้อยละ 26.67 และพบว่าสุนัข-แมวติดเชื้อที่พบผลบวก ไม่ได้ฉีดวัคซีนร้อยละ 20 ฉีดวัคซีน ร้อยละ 10 และไม่ทราบประวัติร้อยละ 70

### สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าจังหวัดศรีสะเกษ

สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าจังหวัดศรีสะเกษ สะสมวันที่ 1 มกราคม – 19 มกราคม 2569 ปี 2568 จังหวัดศรีสะเกษ : ไม่พบผู้ป่วยเสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า พบสัตว์ติดเชื้อสะสมร้อยละ 100 (4/4 ตัว) ชนิดสัตว์ที่ติดเชื้อ : โค 3/4 ตัว (75%) และ กระบือ 1/4 ตัว (25%) พบสัตว์ติดเชื้อทั้งหมด 2 อำเภอ ทั้งหมดจำนวน 4 เหตุการณ์ ได้แก่ อำเภอเมืองศรีสะเกษ และอำเภอยุทธ์ พบผู้สัมผัสทั้งหมด 16 ราย ได้รับวัคซีน ครบชุดแล้ว 16 ราย คิดเป็นร้อยละ 100

### มาตรการในการดำเนินงาน

1. กำหนดเป็นตัวชี้วัด(KPI) ระดับอำเภอ เพื่อติดตามผู้สัมผัสสัตว์ติดเชื้อยืนยันโรคพิษสุนัขบ้า ให้ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าครบชุด ตามแนวทางเวชปฏิบัติขับเคลื่อนการดำเนินงานในพื้นที่ โดยจะมีการติดตามทุกไตรมาส
2. ลงพื้นที่ติดตาม สอบสวนในพื้นที่ กรณีพบสัตว์ติดเชื้อยืนยันโรคพิษสุนัขบ้า ร่วมกับพื้นที่และภาคีเครือข่าย

### ผลการดำเนินงาน

ผู้สัมผัสสัตว์ติดเชื้อยืนยันโรคพิษสุนัขบ้า ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าครบชุด ตามแนวทางเวชปฏิบัติ

### 1.3 สถานการณ์โรคเลปโตสไปโรซิส

สถานการณ์โรคเลปโตสไปโรซิส (โรคฉี่หนู) ภาพรวมของประเทศไทย นับจากวันที่ 1 มกราคม – 19 มกราคม 2569 พบผู้ป่วย 126 ราย อัตราป่วย 0.194 ต่อแสนประชากร กลุ่มอายุที่ป่วยมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ อายุ 60 ปีขึ้นไป จำนวน 43 ราย สัญชาติไทย ร้อยละ 96 จังหวัดที่มีอัตราป่วยโรคเลปโตสไปโรซิสสูงสุด 10 อันดับแรก ได้แก่ สงขลา ชุมพร ระนอง น่าน นครศรีธรรมราช ยะลา ตรัง สุรินทร์ และ ศรีสะเกษ ตามลำดับ ดังตารางที่ 4

ตารางที่ 4 จังหวัดที่มีอัตราป่วยโรคเลปโตสไปโรซิสสูงสุด 10 อันดับแรก

| ลำดับ | จังหวัด       | จำนวนผู้ป่วย | เสียชีวิต | อัตราป่วยต่อแสนประชากร | อัตราย | อัตราป่วยตาย |
|-------|---------------|--------------|-----------|------------------------|--------|--------------|
| 1     | สงขลา         | 24           | 0         | 1.70                   | 0      | 0            |
| 2     | ชุมพร         | 6            | 0         | 1.19                   | 0      | 0            |
| 3     | ระนอง         | 2            | 0         | 1.12                   | 0      | 0            |
| 4     | น่าน          | 5            | 0         | 1.06                   | 0      | 0            |
| 5     | นครศรีธรรมราช | 13           | 0         | 0.84                   | 0      | 0            |
| 6     | ยะลา          | 4            | 0         | 0.74                   | 0      | 0            |
| 7     | ตรัง          | 4            | 0         | 0.63                   | 0      | 0            |
| 8     | สุรินทร์      | 8            | 0         | 0.58                   | 0      | 0            |
| 9     | อุบลราชธานี   | 10           | 0         | 0.54                   | 0      | 0            |
| 10    | ศรีสะเกษ      | 7            | 0         | 0.48                   | 0      | 0            |
| รวม   |               | 126          | 0         | 0.194                  | 0      | 0            |

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 19 มกราคม 2569 กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

สถานการณ์โรคเลปโตสไปโรซิส (โรคฉี่หนู) ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 19 มกราคม 2569 พบผู้ป่วยเลปโตสไปโรซิส จำนวน 38 ราย อัตราป่วย 0.175 ต่อแสนประชากร จังหวัดที่มีอัตราป่วยสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ สุรินทร์ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ อุตรธานี และกาฬสินธุ์ ดังตารางที่ 5

ตารางที่ 5 จังหวัดที่มีอัตราป่วยโรคเลปโตสไปโรซิส สูงสุด 10 อันดับแรก ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

| ลำดับ | จังหวัด     | จำนวนผู้ป่วย | เสียชีวิต | อัตราป่วยต่อแสนประชากร | อัตราย | อัตราป่วยตาย |
|-------|-------------|--------------|-----------|------------------------|--------|--------------|
| 1     | สุรินทร์    | 8.00         | 0         | 0.58                   | 0      | 0            |
| 2     | อุบลราชธานี | 10.00        | 0         | 0.54                   | 0      | 0            |
| 3     | ศรีสะเกษ    | 7.00         | 0         | 0.48                   | 0      | 0            |
| 4     | อุตรธานี    | 5.00         | 0         | 0.32                   | 0      | 0            |
| 5     | กาฬสินธุ์   | 3.00         | 0         | 0.31                   | 0      | 0            |
| 6     | มุกดาหาร    | 1.00         | 0         | 0.29                   | 0      | 0            |
| 7     | ร้อยเอ็ด    | 2.00         | 0         | 0.16                   | 0      | 0            |
| 8     | มหาสารคาม   | 1.00         | 0         | 0.11                   | 0      | 0            |
| 9     | นครราชสีมา  | 1.00         | 0         | 0.04                   | 0      | 0            |

| ลำดับ | จังหวัด | จำนวนผู้ป่วย | เสียชีวิต | อัตราป่วยต่อแสนประชากร | อัตราตาย | อัตราป่วยตาย |
|-------|---------|--------------|-----------|------------------------|----------|--------------|
| 10    | ขอนแก่น | 0.00         | 0         | 0.00                   | 0        | 0            |
|       | รวม     | 38           | 0         | 0.175                  | 0        | 0            |

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 19 มกราคม 2569 กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค


จังหวัดศรีสะเกษ มีอัตราป่วยด้วยโรคเลปโตสไปโรซิสสูงสุดเป็นอันดับที่ 12 ของประเทศ อันดับที่ 1 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และอันดับที่ 2 ของเขตสุขภาพที่ 10 ดังตารางที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 19 มกราคม 2569 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีรายงานผู้ป่วยโรคเลปโตสไปโรซิส (โรคฉี่หนู) จำนวนทั้งสิ้น 7 ราย อัตราป่วย 0.482 ต่อประชากรแสนคน อำเภอที่มีอัตราป่วยสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ อำเภอวังหิน อำเภอขุนหาญ อำเภอภูสิงห์ อำเภอปรางค์กู่ และอำเภอราชไศล ดังตารางที่ 6

**ตารางที่ 6** อัตราป่วยโรคเลปโตสไปโรซิส แยกรายอำเภอ ในจังหวัดศรีสะเกษ

| ลำดับ | จังหวัด        | จำนวนผู้ป่วย | เสียชีวิต | อัตราป่วยต่อแสนประชากร | อัตราตาย | อัตราป่วยตาย |
|-------|----------------|--------------|-----------|------------------------|----------|--------------|
| 1     | วังหิน         | 2            | 0         | 3.96                   | 0        | 0            |
| 2     | ขุนหาญ         | 2            | 0         | 1.88                   | 0        | 0            |
| 3     | ภูสิงห์        | 1            | 0         | 1.83                   | 0        | 0            |
| 4     | ปรางค์กู่      | 1            | 0         | 1.51                   | 0        | 0            |
| 5     | ราชไศล         | 1            | 0         | 1.26                   | 0        | 0            |
| 6     | กันทรลักษ์     | 0            | 0         | 0.00                   | 0        | 0            |
| 7     | กันทรารมย์     | 0            | 0         | 0.00                   | 0        | 0            |
| 8     | ขุขันธ์        | 0            | 0         | 0.00                   | 0        | 0            |
| 9     | น้ำเกลี้ยง     | 0            | 0         | 0.00                   | 0        | 0            |
| 10    | โนนคูณ         | 0            | 0         | 0.00                   | 0        | 0            |
| 11    | บึงบูรพ์       | 0            | 0         | 0.00                   | 0        | 0            |
| 12    | เบญจลักษ์      | 0            | 0         | 0.00                   | 0        | 0            |
| 13    | พยุห์          | 0            | 0         | 0.00                   | 0        | 0            |
| 14    | โพธิ์ศรีสุวรรณ | 0            | 0         | 0.00                   | 0        | 0            |
| 15    | ไพรบึง         | 0            | 0         | 0.00                   | 0        | 0            |
| 16    | เมืองจันทร์    | 0            | 0         | 0.00                   | 0        | 0            |
| 17    | เมืองศรีสะเกษ  | 0            | 0         | 0.00                   | 0        | 0            |
| 18    | ยางชุมน้อย     | 0            | 0         | 0.00                   | 0        | 0            |
| 19    | ศรีรัตนะ       | 0            | 0         | 0.00                   | 0        | 0            |
| 20    | ศีลาลาด        | 0            | 0         | 0.00                   | 0        | 0            |
| 21    | ห้วยทับทัน     | 0            | 0         | 0.00                   | 0        | 0            |
| 22    | อุทุมพรพิสัย   | 0            | 0         | 0.00                   | 0        | 0            |
|       | รวม            | 7            | 0         | 0.482                  | 0        | 0            |

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 19 มกราคม 2569 กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

ภาพที่ 1 จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคเลปโตสไปโรซิส พ.ศ.2569 ในจังหวัดศรีสะเกษ



ปี 2569 มีแนวโน้มพบผู้ป่วยโรคเลปโตสไปโรซิน้อยกว่าปี 2568 และค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง โดยพบผู้ป่วยเลปโตสไปโรซิสตั้งในเดือนมกราคม จำนวน 7 ราย ต่ำกว่าค่ามัธยฐานรายเดือน และยังต่ำกว่าข้อมูลผู้ป่วยรายเดือน ในปี 2568



ผลการดำเนินงานการลดป่วยและเสียชีวิตด้วยโรคเลปโตสไปโรซิส

| กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน                                                                         | กิจกรรมที่ดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                           | การประเมินผลกิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                       | การประเมินผลงานตามวัตถุประสงค์หลัก                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขด้านการป้องกันและควบคุมโรคเลปโตสไปโรซิส | จัดประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินอาการ การดูแลรักษา และการส่งต่อผู้ป่วยโรคเลปโตสไปโรซิส การจัดการผู้ป่วยรายกรณี โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ<br>กลุ่มเป้าหมาย คือ แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำ รพศ. รพท. รพช. และ รพ.เอกชน | กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำ รพศ. รพท. รพช. และ รพ.เอกชน เข้าร่วมประชุมครบ ทุกแห่ง                                                                                                                                                      | 1. สสจ. ศรีสะเกษ มีแผนจัดประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินอาการ การดูแลรักษา และการส่งต่อผู้ป่วยโรคเลปโตสไปโรซิส ภายในเดือนเมษายน 2569<br>2. การจัดทำแนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคเลปโตสไปโรซิส ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง                                                                     |
| 2. การสอบสวน ควบคุมการระบาดของโรคเลปโตสไปโรซิส                                                    | 1. อำเภอที่มีรายงานผู้ป่วยโรคเลปโตสไปโรซิส ได้ดำเนินการสอบสวน ค้นหาผู้ป่วยเพิ่มเติม และควบคุมโรค และจัดทำรายงานสอบสวนโรคเสนอผู้บังคับบัญชาให้ทราบ                                                                             | 1. เจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดำเนินการสอบสวนโรค และจัดทำรายงานสอบสวนโรคเลปโตสไปโรซิสเสนอผู้บริหารทุกราย<br>2. การสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ประชาชนในการป้องกันโรคเลปโตสไปโรซิส<br>3. การพัฒนาระบบการแสดงผลการระบุพิกัดแหล่งโรคเลปโตสไปโรซิส | 1. เจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำ รพ.สต. จัดทำรายงานสอบสวนโรคเลปโตสไปโรซิส เสนอผู้บริหารทุกราย คิดเป็นร้อยละ 100%<br>2. มีการจัดทำโปสเตอร์ สื่อประชาสัมพันธ์ในการป้องกันโรคเลปโตสไปโรซิสทุกเดือน<br>3. ระบบการสอดส่องพิกัดแหล่งโรค และการกระจายเชิงพื้นที่เกิดโรคเลปโตสไปโรซิส อยู่ระหว่างปรับปรุงพัฒนาระบบ |

| กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน                 | กิจกรรมที่ดำเนินงาน | การประเมินผลกิจกรรม | การประเมินผลงาน<br>ตามวัตถุประสงค์หลัก                                                                                                 |
|-------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. อัตราป่วยน้อยกว่า 10 ต่อแสน<br>ประชากร |                     |                     | - ปี 2569 พบผู้ป่วยเลปโตสไปโรซิส<br>จำนวน 7 ราย อัตราป่วย 0.482<br>ต่อแสนประชากร<br>- มีแนวโน้มลดลง และจำนวนผู้ป่วยน้อย<br>กว่าปี 2568 |
| 4. อัตราป่วยตาย ไม่เกินร้อยละ 1 ต่อ       |                     |                     | - ปี 2569 พบผู้ป่วยเสียชีวิต 0 ราย<br>อัตราตาย 0 ต่อแสนประชากร                                                                         |